

嗎啡貼片使用須知

吩坦尼貼片(Fentanyl Patch)是一種鴉片類的止痛藥，透過經皮吸收的方式，將藥物慢慢釋放，提供持續性止痛的效果。這種貼片的止痛效果比目前絕大多數口服止痛藥的效果都還要好，而且極少造成明顯的副作用。

貼上皮膚後，貓咪約需 6 小時，狗狗約需 12 小時會達到最強止痛效果，一般來說，效果約可持續四天左右的時間。由於鴉片類藥物是管制藥品，為防止濫用或造成意外，在使用上請您務必注意以下事項：

- ✚ 吩坦尼貼片是國家規定的第二級管制藥品，使用上必須遵守國家相關法律，在獸醫師監督下使用。您應該在與醫師預約的時間來院，由醫師親自貼上與移除貼片。若是在家中不慎脫落，請對折後利用夾鏈袋妥善保存，在回診時交還給醫師。請切勿將貼片的黏膠面接觸您的皮膚。家中如有幼兒，請注意勿讓鬆脫的貼片被撕下誤食。
- ✚ 加熱會造成吩坦尼貼片的吸收速度增加，在使用時，必須避免貼片長時間的熱源接觸（例如電毯，加熱燈等），以免吸收過量，過量的症狀包括心跳或呼吸徐緩、嘔吐、顫抖、癲癇、極度困倦甚至精神恍惚等現象，但是因此危及生命是極為罕見的，若出現上述症狀請儘快與醫師聯絡。
- ✚ 吩坦尼貼片在某些動物會引起藥疹，造成貼片周圍紅腫，較嚴重過敏的病患則會有全身性紅疹的出現。其它可能出現的藥物不良反應包括尿滯留、食慾不振、便秘、焦慮或狂躁。
- ✚ 在一些重度疼痛或神經性疼痛的情形下，吩坦尼貼片可能無法提供全面的止痛。但是依然能夠得到部分的效果。動物如果能夠在熟悉安靜的環境，並有主人相伴，將可以得到較完全的止痛效果。
- ✚ 貼片撕除後，該處皮膚之毛髮生長可能較慢，或出現新生毛髮變色或皮膚變色之症狀(罕見)。

整體而言，吩坦尼貼片的使用安全性極高，若您在家裡觀察到動物有任何上述的不適現象，請儘快與我們聯絡或來院處理，我們將樂於為您服務。若是適逢假日無法即時就診，也可先將貼片撕下以減輕副作用。貼片請利用夾鏈袋妥善保存，在回診時交還給醫師。

