

亞太動物醫療中心

(請保留此單至動物拆線為止)

術後照顧須知

1. 保暖：動物離院時通常體溫已恢復，適度保暖即可。
2. 進食進水：
 - ✓ 動物回家後，如果意識清醒並且可以抬頭、站立後，就可以開始少量餵水(約 5-10cc)，一般建議於麻醉停止後 4 小時餵水。開始餵水的時間：_____。開始進食後如無異狀即可自由飲水。
 - ✓ 如果有嘔吐的狀況，請讓腸胃休息一至兩個小時後，再少量給水。如果嘔吐狀況持續，請務必與醫生連絡。
 - ✓ 回家當天如果餵水之後沒有嘔吐，於_____就可以少量進食(正常一餐量的 1/4)，如果食慾不佳，不要勉強，隔天上午再試試看。術後兩三天內，以少量多餐較軟食物為佳。進行腸胃道手術的動物，應依照醫囑為動物禁食水。口腔手術則依醫囑給予數日軟食。
2. 術後藥物：
 - ✓ 術後請按時給動物吃藥，以預防併發症。抗生素等藥物請於_____開始服用，止痛藥則遵循醫囑視狀況服用。
 - ✓ 如果有使用嗎啡類止痛藥，請詳閱相關須知。如果有使用管制品的嗎啡止痛貼片，請務必小心以免遺失。
3. 排尿排便：
 - ✓ 後半身或肢體手術的動物，因為肚子用力時可能會引發腹部或肢體不舒服，所以術後四到五天內未解大便都仍然是正常的。
 - ✓ 手術後若超過一日未排尿，需與醫師聯絡。
4. 傷口照護：
 - ✓ 除非醫師另有囑咐，手術傷口應該保持乾淨乾燥，不要包紮或塗抹任何外用藥物。
 - ✓ 若有包紮，請勿沾濕，若沾濕請與醫師聯絡。
 - ✓ 若無特別醫囑，請全天配戴伊莉莎白頸圈，以防動物啃咬傷口造成發炎或傷口裂開。
 - ✓ 動物身上留置的軟針及導尿管，必須在 48 小時內拆除或更換，以避免併發症。傷口的引流管，則請依照醫囑照顧。
 - ✓ 一般拆線時間為術後 7-14 天，本院術後拆線免費。一般手術於拆線後兩天才可洗澡。
5. 術後頭幾日可能因氣管不適發生咳嗽狀況，通常會自行緩解，若超過三日仍有咳嗽請與醫師聯絡。
6. 主刀醫師會在術後問候病患的狀況，麻煩保持您電話的暢通。如有任何手術相關的問題，請撥電話 02-2930-0007 或 02-2930-0005。