






# 亞太動物醫療中心

ASIA PACIFIC ANIMAL SURGICAL CENTER

犬術後疼痛評分量表

疼痛 評分	圖示範例	精神 與 行為	對觸摸的反應
0		<ul style="list-style-type: none"> <li>☺ 舒適地休息</li> <li>☺ 愉悅</li> <li>☺ 不在意傷口</li> <li>☺ 對周遭環境感興趣或好奇</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 觸摸傷口或其他部位不會感到敏感</li> </ul>
1		<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 輕微的焦躁不安</li> <li>☹ 容易因周遭環境轉移注意力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 對觸摸傷口或其他部位有反應，如：環顧四週、退縮或嗚咽</li> </ul>
2		<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 休息時感到不適</li> <li>☹ 當無人看著時，可能嗚咽或哭叫，且可能會舔或摩擦傷口</li> <li>☹ 耳朵下垂，表情不安（眉毛拱起、眼神游移）</li> <li>☹ 不願回應召喚</li> <li>☹ 不想與周遭環境或人互動，但會觀察周圍變化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 畏縮、嗚咽、哭叫、防備或拉開距離</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 當無人看著時，不安、哭叫、嗚咽或咬傷口</li> <li>☹ 藉由改變身體重心分布來防衛或保護傷口（如：跛行或改變姿勢）</li> <li>☹ 可能不願意移動身體（部分或全身）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 可能反應劇烈，尖叫、咆哮、咬或拉開距離</li> <li>☹ 有時過度疼痛可能導致對於觸摸反而沒有劇烈反應（只移動目光或呼吸變快）</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 當無人看著時，不斷呻吟或尖叫</li> <li>☹ 可能啃咬傷口，不願意移動身體</li> <li>☹ 可能對周遭環境無反應</li> <li>☹ 難以使其轉移對疼痛的注意力</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☹ 對非疼痛性的觸摸發出哭叫</li> <li>☹ 對觸摸具攻擊性反應</li> </ul>