



**Instituto Superior de Ciências de Saúde
EXAME DE ADMISSÃO 2018 -CIRURGIA**

Assinale com um X a única resposta verdadeiramente correcta de cada pergunta.

1.O antisséptico cutâneo mais eficaz é:

- a)-o iodo a 20% em álcool a 70%; b)-o iodo a 10% em álcool a 90%;c)-o iodo a 15% em álcool a 90%;
d)-o iodo a 20% emácool a 90%;e)-o iodo a 10% em álcool a 70%.

2.Na hipovolémia ligeira há um défice de volume sanguíneo de:

- a)-10 a 20%; b)-05 a 10%; c)-15 a 20%; d)-20 a 30%; e)-30 a 40%.

3.As úlceras cutâneas com bordos arredondados podem corresponder a um(a):

- a)-carcinoma escamocelular; b)-sarcoma de Kaposi; c)-carcinoma epidermóide;
d)-melanoma maligno; e)-carcinoma basocelular.

4.O principal problema imediato da ferida operatória é o(a):

- a)-hemorragia; b)-dor; c)-edema; d)-deiscência; e)-infecção.

5.Segundo a OMS considera-se anemia quando a hemoglobina na mulher é inferior a:

- a)-08 gr/dl; b)-14 gr/dl; c)-12 gr/dl; d)-11 gr/dl; e)-10 gr/dl.

6.O estabelecimento cirúrgico de uma comunicação entre o rim e a pele chama-se:

- a)-nefrostomia; b)-nephropexia; c)-nephrotomia; d)-nephrografia; e)-nephrectomia.

7.Após uma cirurgia limpa e em incisões fechadas sem tensão os pontos devem ser retirados em:

- a)-03 a 05 dias; b)-07 a 10 dias; c)-10 a 12 dias; d)-05 a 07 dias; e)-12 a 15 dias.

8.Numa criança de 04 anos com cartão de peso em dia vítima de uma mordedura de crocodilo deve fazer-se:

- a)-VAT, analgésicos e antibióticos; b)-SAT, VAT, analgésicos e antibióticos; c)-analgésicos e antibióticos apenas;
d)-SAT, analgésicos e antibióticos; e)-VAT, SAT e analgésicos.

9.As feridas incisas podem ser suturadas desde que tenham menos de:

- a)-24 horas; b)-08 horas; c)-10 horas; d)-12 horas; e)-06 horas.

10.A toxémia sistémica associada a dor, edema, eritema e crepitação em redor da ferida operatória é sugestiva de infecção por:

- a)-Escherichiacoli; b)-Clostrídiums; c)-Estreptococos; d)-Salmonelas; e)-Estafilococos.

11.O pior soro para combater o choque hemorrágico é o(a):

- a)-soro fisiológico; b)-dextrose a 05%; c)-lactato de ringer; d)-plasmagel; e)-polielectrolítico de restituição.

12.A diurese horária mínima aceitável de um adulto jovem é de:

- a)-10 a 30 ml; b)-20 a 60 ml; c)-30 a 50 ml; d)-40 a 80 ml; e)-50 a 100 ml.

13.O agente etiológico da erisipela é o(a):

- a)-Estreptococos; b)-Pseudomonas; c)-Estafilococos; d)-Escherichiacoli; e)-Salmonela.

14. A via mais importante de infecção durante as intervenções cirúrgicas é o(a):

- a)-instrumental; b)-roupa; c)-ambiente; d)-respiração; e)-mão.



**Instituto Superior de Ciências de Saúde
EXAME DE ADMISSÃO 2018 –CIRURGIA**

15. A tesoura usada para a diérese dos tecidos moles é a de:

- a)-Mayo; b)-Halsted; c)-Mixter; d)-Metzembau; e)-Rochester.

16. O agente mais responsável pela septicemia é o(a):

- a)-Escherichia coli; b)-Enterobacter; c)-Serratia; d)-Proteus; e)-Klebsiella.

17. A causa mais frequente de linfedema crônico em Moçambique é o(a):

- a)-infiltração neoplásica dos gânglios linfáticos; b)-Wuchereria bancrofti; c)-excisão cirúrgica dos gânglios linfáticos; d)-Micobactérium tuberculosis; e)-linfogranuloma inguinal.

18. A transição anatômica entre o esôfago e o estômago chama-se:

- a)-piloro; b)-esfincter esofágico superior; c)-ligamento de Treitz; d)-válvula ileo-cecal; e)-cardias.

19. O canal que comunica a vesícula biliar com a via biliar principal chama-se:

- a)-colédoco; b)-de Santorini; c)-cístico; d)-hepático comum; e)-de Wirsung.

20. O anestésico local mais usado é o(a):

- a)-xiloacina com adrenalina; b)-quetamina; c)-bupivacaína; d)-lidocaína sem adrenalina; e)-tiopental.

II

Assinale com um X a única alínea errada de cada pergunta:

21. Segundo a OMS é analgésico do nível 2 o(a):

- a)-Paracetamol; b)-Ibuprofeno; c)-Codeína; d)-Tramadol; e)-Morfina.

22. A hemoglobina mínima aceitável para se operar um paciente depende:

- a)-se há doença respiratória associada; b)-se há doença digestiva associada; c)-da idade do paciente; d)-do tipo de cirurgia a realizar; e)-se há doença cardiovascular associada.

23. Uma massa tumoral sangrante do esôfago pode apresentar:

- a)-hematemeses; b)-odinofagia; c)-disfagia; d)-sialorreia; e)-hemoptises.

24. São efeitos secundários frequentes da VAT:

- a)-complicações neurológicas; b)-febre e dor local; c)-reações alérgicas; d)-eritema e edema locais; e)-malestar e irritabilidade.

25. Influencia a cicatrização adequada das feridas o(a):

- a)-deficiência de vitamina A; b)-anemia severa; c)-deficiência de vitamina C; d)-edema acentuado; e)-hipoproteinémia.

26. É causa de abdômen agudo oclusivo ou obstrutivo:

- a)-pancreatite aguda; b)-aderências ou bridas; c)-hérnias da parede abdominal; d)-volvos do íleon; e)-invaginação intestinal.

27. O catéter de veia central pode ser colocado na veia:

- a)-subclávia; b)-jugular interna; c)-branquial; d)-jugular externa; e)-cefálica.



**Instituto Superior de Ciências de Saúde
EXAME DE ADMISSÃO 2018 -CIRURGIA**

28. É um agente desinfectante químico o:

- a)-álcool etílico; b)-óxido de etileno; c)-formaldeído; d)-fenol; e)-hexaclorofeno.

29. É causa de febre pós-operatória a:

- a)-infecção da ferida operatória; b)-pneumonia de estase; c)-atelectasia pulmonar; d)-trombose venosa profunda; e)-tromboflebite superficial.

30. A intoxicação por monóxido de carbono caracteriza-se por:

- a)-visão turva; b)-fatigabilidade fácil; c)-irritabilidade; d)-náuseas; e)-alucinações.

31. É causa de hemoptises o(a):

- a)-laceração do pulmão; b)-empíema pleural; c)-bronquiectasia; d)-abcesso do pulmão; e)-tuberculose pulmonar .

32. É complicação pós-operatória precoce o(a):

- a)-hemorragia; b)-broncopneumonia; c)-tromboembolismo; d)-atelectasia pulmonar; e)-escara de decúbito.

33. A região de maior risco de ocorrência das úlceras de pressão é:

- a)-escapular; b)-sacral; c)-trocantérica; d)-calcaneo; e)-tornozelo.

34. É um dreno tubular o de:

- a)-Foley; b)-Pezzer; c)-Naletton; d)-Penrose; e)-Malecot.

35. A medida mais importante para a profilaxia das infecções pós-operatórias é a:

- a)-antissépsia adequada; b)-boa preparação pré-operatória; c)-antibioterapia prolongada; d)-hemostasia meticulosa; e)-técnica cirúrgica apurada.

36. Quanto à profundidade as queimaduras classificam-se em:

- a)-1º grau; b)-3º grau; c)-2º grau superficial; d)-4º grau; e)-2º grau profundo.

37. É critério minor (de Bangui) da SIDA a:

- a)-tosse há mais de 1 mês; b)-candidíase orofaríngea; c)-febre há mais de 1 mês; d)-dermatite generalizada;
e)-linfadenopatia generalizada.

38. É risco das transfusões:

- a)-coagulopatia; b)-hipertermia; c)-transmissão de doenças infecciosas; d)-reações imunológicas;
e)-sobrecarga circulatória.

39. As cobras venenosas possuem venenos:

- a)-neurotóxicos; b)-hematotóxicos; c)-citotóxicos; d)-nefrotóxicos; e)-mixtos.

40. Os intoxicados por organofosforados podem apresentar:

- a)-sudorese; b)-bradicardia; c)-miose; d)-fasciculação muscular; e)-taquicardia.

BOM TRABALHO!