

# Diferensiyel Denklemler I

## Uygulama Notları

Mustafa Özdemir

### İçindekiler

Temel Bilgiler .....	2
Tam Diferensiyel Denklemler .....	4
Ayrılabilir Diferensiyel Denklemler .....	7
Homojen Diferensiyel Denklemler .....	13
Lineer Diferensiyel Denklemler .....	17
Bernoulli Diferensiyel Denklemler .....	19
İntegrasyon Çarpanının Belirlenmesi .....	23
İki değişkenli lineer katsayılı diferensiyel denklemlerin çözümü .....	27
Riccati Diferensiyel Denklemi .....	31
Eğri Ailelerinin yörüngelerinin Denkleminin bulunması .....	34
Clairaut Diferensiyel Denklemleri .....	37

## Diferensiyel Denklemlerle İlgili Temel Bilgiler

Soru 1: Aşağıdaki diferensiyel denklemlerin adi-kısmi olup olmadığını, mertebesini, lineer olup olmadığını, lineer is katsayısının türünü belirtiniz.

a)  $\frac{d^2y}{dx^2} + x^3y - xe^x = 0$

b)  $\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - 2y = 0$

c)  $\left(\frac{dr}{d\theta}\right)^3 = \sqrt{\frac{d^2r}{d\theta^2} + 1}$

d)  $\frac{\partial^2u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2u}{\partial y^2} = 1$

e)  $\frac{\partial^2y}{\partial x^2} + \frac{\partial^3y}{\partial z^3} + x \sin y = 0$

f)  $\frac{d^4y}{dx^4} + 3\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^5 + 5y = 0$

g)  $\frac{dr}{d\theta} = \sqrt{r\theta}$

h)  $y'' + xy = \sin y''$

i)  $\frac{\partial^2y}{\partial x^2} + \frac{\partial y}{\partial z} + y \sin x = 0$

Çözüm :

a) 2.mertebeden, değişken katsayılı lineer adi diferensiyel denklem.

b) 3.mertebeden,sabit katsayılı lineer adi diferensiyel denklem.

c) 2.mertebeden, lineer olmayan adi diferensiyel denklem.

d) 2.mertebeden, sabit katsayılı lineer kısmi diferensiyel denklem.

e) 3.mertebeden, lineer olmayan kısmi diferensiyel denklem.

f) 4.mertebeden, lineer olmayan adi diferensiyel denklem.

g) 1.mertebeden, lineer olmayan adi diferensiyel denklem.

h) 2.mertebeden, lineer olmayan adi diferensiyel denklem.

i) 2.mertebeden, değişken katsayılı lineer kısmi diferensiyel denklem.

Soru 1:  $(y - c_1)^2 + (x - c_2)^2 = 1$  denklemindeki sabitleri yok ederek diferensiyel denklem oluşturunuz.

Çözüm : Denklemin  $x$  değişkenine göre iki kez türevini alalım.

$$2(y - c_1)y' + 2(x - c_2) = 0$$

$$2y'y' + 2(y - c_1)y'' + 2 = 0$$

olur. Son denklemden  $c_1$  sabitini yalnız bırakırsak,

$$c_1 = \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''}$$

olur. Bu ifadeyi birinci türevde yerine yazıp  $c_2$  yi bulalım.  $2 \left( y - \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''} \right) y' + 2(x - c_2) = 0$  eşitliğinden

$$c_2 = \frac{-y' - (y')^3 + xy''}{y''}$$

bulunur.  $c_1$  ve  $c_2$  sabitlerini ilk denklemde yerine yazalım.

$$\left( y - \frac{1 + (y')^2 + yy''}{y''} \right)^2 + \left( x - \frac{-y' - (y')^3 + xy''}{y''} \right)^2 = 1$$

eşitliğinde gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$\left( 1 + (y')^2 \right)^2 + \left( y' + (y')^3 \right)^2 = y''$$

diferensiyel denklemi elde edilir.

#### ALIŞTIRMALAR

**Aşağıdaki denklemlerdeki sabitleri yok ederek diferensiyel denklem oluşturunuz.**

- $y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{3x}$
- $(x - c)^2 + y^2 = c^2$
- $y^2 = 4cx$
- $y = x^2 + c_1 e^x + c_2 e^{3x}$
- $y = c_1 e^{2x} \cos 3x + c_2 e^{2x} \sin 3x$

**Cevaplar :**

- $y'' - y' - 6y = 0$
- $(x^2 - y^2) dx + 2xy dy = 0$
- $2xdy - ydx = 0$
- $y'' - 5y' + 6y = 6x^2 - 10x + 2$
- $y'' - 4y' + 13y = 0$

## Tam Diferensiyel Denklemler

Soru 1 :  $2xydx + (x^2 + \cos y) dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $M = 2xy$  ve  $N = x^2 + \cos y$  olduğundan,  $\frac{\partial M}{\partial y} = 2x = \frac{\partial N}{\partial x}$  olduğundan denklem bir tam diferensiyel denklemdir. Dolayısıyla öyle bir  $U(x, y)$  fonksiyonu vardır ki,  $M = \frac{\partial U}{\partial x} = 2xy$  ve  $N = \frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + \cos y$  'dir.

$\frac{\partial U}{\partial x} = 2xy$  eşitliğini  $x$  değişkenine göre integre edersek,  $U(x, y) = x^2y + \varphi(y)$  elde edilir.

Ayrıca,  $\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + \varphi'(y) = x^2 + \cos y$  eşitliğinden  $\varphi'(y) = \cos y$  ve  $\varphi(y) = \sin y + c_1$  elde edilir. Böylece,  $U(x, y) = x^2y + \sin y + c_1 = c_2$  ve istenen genel çözüm  $x^2y + \sin y = c$  olarak bulunur.

Soru 2 :  $\left. \begin{array}{l} y' = \frac{xy^2 - 1}{1 - x^2y} \\ y(0) = 1 \end{array} \right\}$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm : Denklem düzenlenirse

$$(xy^2 - 1) dx + (x^2y - 1) dy = 0$$

olur. Buradan,  $M = (xy^2 - 1)$  ve  $N = (x^2y - 1)$  için,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğundan denklem bir tam diferensiyel denklemdir. Dolayısıyla öyle bir  $U(x, y)$  fonksiyonu vardır ki,

$$M = \frac{\partial U}{\partial x} = (xy^2 - 1) \text{ ve } N = \frac{\partial U}{\partial y} = (x^2y - 1)$$

'dir.  $\frac{\partial U}{\partial x} = (xy^2 - 1)$  eşitliği  $x$  'e göre integre edilirse,

$$\int \frac{\partial U}{\partial x} dx = \int (xy^2 - 1) dx$$

ve  $U(x, y) = \frac{x^2y^2}{2} - x + \varphi(y) = c$  bulunur.

Ayrıca,  $N = \frac{\partial U}{\partial y} = (x^2y - 1)$  olduğu göz önüne alınırsa,  $yx^2 + \varphi'(y) = yx^2 - 1$  eşitliğinden,  $\varphi'(y) = -1$  ve  $\varphi(y) = -y + c$  bulunur. Böylece,

$$U(x, y) = \frac{x^2y^2}{2} - x - y = c$$

elde edilir.  $y(0) = 1$  'den  $x = 0$  ve  $y = 1$  yerine yazılırsa,  $c = -1$  bulunur. O halde denklemin çözümü

$$\frac{x^2 y^2}{2} - x - y + 1 = 0$$

olur.

Soru 3:  $\left. \begin{array}{l} \frac{dr}{d\theta} = \frac{r^2 \sin \theta}{2r \cos \theta - 1} \\ \theta(2) = \pi \end{array} \right\} \text{diferensiyel denklemini çözünüz.}$

Çözüm:  $(2r \cos \theta - 1) dr - (r^2 \sin \theta) d\theta = 0$  denkleminde  $M = (2r \cos \theta - 1)$  ve  $N = -(r^2 \sin \theta)$  için

$$\frac{\partial M}{\partial \theta} = -2r \sin \theta = \frac{\partial N}{\partial r}$$

olduğundan denklem bir tam diferensiyel denklemdir. Dolayısıyla öyle bir  $U(r, \theta)$  fonksiyonu vardır ki,

$$M = \frac{\partial U}{\partial r} = (2r \cos \theta - 1) \text{ ve } N = \frac{\partial U}{\partial \theta} = -(r^2 \sin \theta)$$

'dir.  $\frac{\partial U}{\partial r} = (2r \cos \theta - 1)$  eşitliğini  $r$  'ye göre integre edersek,

$$\int \frac{\partial U}{\partial r} dr = \int (2r \cos \theta - 1) dr \text{ ve } U(r, \theta) = r^2 \cos \theta - r + \varphi(\theta) = c$$

bulunur. Ayrıca,  $N = \frac{\partial U}{\partial \theta} = -(r^2 \sin \theta)$  olduğu göz önüne alınırsa,  $-r^2 \sin \theta + \varphi'(\theta) = -(r^2 \sin \theta)$  eşitliğinden,  $\varphi'(\theta) = 0$  ve  $\varphi(\theta) = c$  bulunur. Böylece,

$$U(r, \theta) = r^2 \cos \theta - r = c$$

elde edilir.  $\theta(2) = \pi$  'den  $r = 2$  ve  $\theta = \pi$  yerine yazılırsa,  $c = -4 - 2 = -6$  bulunur. O halde denklemin çözümü

$$r^2 \cos \theta - r + 6 = 0$$

olur.

## ALIŞTIRMALAR

**Aşağıdaki tam diferensiyel denklemleri çözünüz**

- $3x(xy - 2)dx + (x^3 + 2y)dy = 0$
- $(2x^3 - xy^2 - 2y + 3)dx - (x^2y + 2x)dy = 0$
- $(2xy - y)dx + (x^2 + x)dy = 0$

- d)  $[2x + y \cos(xy)] dx + x \cos(xy) dy = 0$   
 e)  $(r + \sin \theta - \cos \theta) dr + r(\cos \theta + \sin \theta) d\theta = 0$   
 f)  $[2xy \cos(x^2) - 2xy + 1] dx + [\sin(x^2) - x^2] dy = 0$   
 g)  $(\sin \theta - 2r \cos^2 \theta) dr + r \cos \theta (2r \sin \theta + 1) d\theta = 0$   
 h)  $(2xy - \tan y) dx + (x^2 - x \sec^2 y) dy = 0$   
 i)  $(w^2 + wz^2 - z) dw + (z^3 + w^2z - w) dz = 0$   
 j)

**Cevaplar :**

- a)  $x^3y - 3x^2 + y^2 = c$   
 b)  $x^4 - x^2y^2 - 4xy + 6x = c$   
 c)  $y(x + 1)^3 = cx$   
 d)  $x^2 + \sin(xy) = c$   
 e)  $r^2 + 2r(\sin \theta - \cos \theta) = c$   
 f)  $y[\sin(x^2) - x^2] = c - x$   
 g)  $r \sin \theta - r^2 \cos^2 \theta = c$   
 h)  $x^2y - x \tan y = c$   
 i)  $(w^2 + z^2)^2 = 4wz + c$

## Ayrılabilir Diferensiyel Denklemler

Soru 1 :  $\cos y \frac{dy}{dx} + 2x - 2x \sin y = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $\cos y \frac{dy}{dx} + 2x(1 - \sin y) = 0$  denkleminin her tarafını  $\cos y$  ile bölersek,

$$\frac{dy}{dx} = -2x \frac{(1 - \sin y)}{\cos y}$$

ve düzenlersek

$$\frac{\cos y}{1 - \sin y} dy + 2x dx = 0$$

ayrılabilir dif. denklemi elde edilir. Buradan,

$$-\ln |1 - \sin y| + x^2 + c = 0$$

eşitliğinden

$$1 - \sin y = e^{x^2+c}$$

bulunur.

Soru 2 :  $(xy + 2x + y + 2) dx + (x^2 + x) dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm : Katsayıları çarpanlarına ayırırsak,  $(x + 1)(y + 2) dx + (x + 1) x dy = 0$  elde edilir. Buradan, aynı değişkeni içeren ifadeleri bir araya getirmek için her tarafı  $(y + 2)(x(x + 1))$  ile bölersek,

$$\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y + 2} = 0$$

elde edilir. Bu denklemin integre edilmesiyle  $\ln |x| + \ln |y + 2| = \ln c$  veya  $x(y + 2) = c$  bulunur.

Soru 3 :  $\frac{dy}{dx} = (x + y + 1)^2$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $x + y + 1 = u$  ve  $1 + \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile denklem  $\frac{du}{dx} = u^2 + 1$  olur. Bu ayrılabilir diferensiyel denklemdir.  $\frac{1}{u^2 + 1} du = dx$  'in integre edilmesiyle  $\arctan u = x + c$  ve buradan  $\arctan(x + y + 1) = x + c$  veya  $\tan(x + c) = x + y + 1$  elde edilir.

Soru 4 :  $\sin x \cos y dx + \cos x \sin y dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm 4 : Bu denklemin bir tam diferensiyel denklem olduğu görülerek çözülebilir. Fakat, aynı zamanda bu denklem bir değişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denklemdir. Gerçekten her tarafı  $\cos x \cos y$  ile bölersek,

$$\frac{\sin x}{\cos x} dx + \frac{\sin y}{\cos y} dy = 0$$

elde edilir. Bu denklemin integrale edilmesiyle  $-\ln |\cos x| - \ln |\cos y| = -\ln |c|$  veya  $\cos x \cos y = c$  elde edilir.

Soru 5:  $y' = \sqrt{2x + y + 1}$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm 5:  $2x + y + 1 = u$ ,  $2 + \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile,  $\frac{du}{dx} - 2 = 2\sqrt{u}$  veya  $\frac{du}{dx} = 2(\sqrt{u} + 1)$  elde edilir. Bu değişkenlerine ayrılabilen bir diferensiyel denklemdir.  $\int \frac{1}{\sqrt{u} + 1} du = \int 2 dx$  integralini hesaplayalım. Bunun için  $\sqrt{u} + 1 = z$ ,  $\frac{1}{2\sqrt{u}} du = dz$  dönüşümünü uygulayalım. Buradan,

$$\int \frac{1}{\sqrt{u} + 1} du = 2 \int \frac{z - 1}{z} dz = 2 \int \left(1 - \frac{1}{z}\right) dz = 2(z - \ln z)$$

olduğu görülebilir. O halde,  $2(z - \ln z) = 2x + c$  eşitliğinde  $z = \sqrt{2x + y + 1} + 1$  yerine yazılırsa,

$$2(\sqrt{2x + y + 1} + 1 - \ln(\sqrt{2x + y + 1} + 1)) = 2x + c$$

elde edilir.

Soru 6:  $y' = \cos(x + y)$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm 6:  $x + y = u$ ,  $1 + \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile,  $\frac{du}{dx} - 1 = \cos u$  değişkenlerine ayrılabilen diferensiyel denklem elde edilir. Buradan,

$$\int \frac{du}{1 + \cos u} = \int dx$$

eşitliğinden,  $\int \frac{du}{1 + \cos u} = x + c$  bulunur. Şimdi,  $\int \frac{du}{1 + \cos u}$  integralini hesaplayalım, bunun için  $\cos u = 2 \cos^2 \frac{u}{2} - 1$  özdeşliğini kullanırsak,  $\int \frac{du}{1 + \cos u} = \int \frac{du}{2 \cos^2 \frac{u}{2}}$  ve  $\frac{u}{2} = v$  dönüşümü ile

$$\int \frac{du}{2 \cos^2 \frac{u}{2}} = \int \frac{dv}{\cos^2 v} = \tan v$$

olur.

Böylece,  $\tan v = x + c$  veya  $\tan \frac{x + y}{2} = x + c$  elde edilir.

Soru 7:  $y' = \tan(x + y)$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm:  $x + y = u$ ,  $1 + \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile denkleminiz



$$\frac{du}{dx} - 1 = \tan u$$

olur. Buradan

$$\frac{du}{\tan u + 1} = dx$$

ve

$$x + c = \int \frac{du}{\tan u + 1}$$

bulunur .Sağ tarafın integrali

$$\tan u = v , (1 + \tan^2 u) du = dv$$

dönüşümü ile

$$\int \frac{du}{\tan u + 1} = \int \frac{dv}{(v + 1)(v^2 + 1)}$$

olur.

$$\frac{A}{v + 1} + \frac{Bv + C}{v^2 + 1} = \frac{1}{(v + 1)(v^2 + 1)}$$

ifadesinden  $A = 1/2$ ,  $B = -1/2$  ve  $C = 1/2$  bulunur. Böylece,

$$\begin{aligned} x + c &= \frac{1}{2} \int \frac{dv}{v + 1} - \frac{1}{2} \int \frac{v - 1}{v^2 + 1} dv = \frac{1}{2} \ln(v + 1) - \frac{1}{4} \int \frac{2v dv}{v^2 + 1} + \frac{1}{2} \int \frac{dv}{v^2 + 1} \\ x + c &= \frac{1}{2} \ln(v + 1) - \frac{1}{4} \ln(v^2 + 1) + \frac{1}{2} \arctan v \end{aligned}$$

ve  $v = \tan(x + y)$  ifadesini yerine yazarak

$$x + c = \frac{1}{2} \ln(\tan(x + y) + 1) - \frac{1}{4} \ln(\tan^2(x + y) + 1) + \frac{1}{2} \arctan(\tan(x + y))$$

genel çözümü bulunur.

Soru 8:  $\frac{dy}{dx} = \frac{y(y^2 - x^2 - 1)}{x(y^2 - x^2 + 1)}$  **diferensiyel denklemini**  $x = r \cos \theta$  **ve**  $y = r \sin \theta$  **dönüşümü yaparak çözünüz.**

Çözüm :  $x = r \cos \theta$  ve  $y = r \sin \theta$  ifadelerinin diferensiyelini alırsak

$$dx = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta$$

$$dy = \sin \theta dr + r \cos \theta d\theta$$

olur. Bunları denklemdede yerine yazalım.

$$\frac{\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta}{\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta} = \frac{r \sin \theta \left( (r \sin \theta)^2 - (r \cos \theta)^2 - 1 \right)}{r \cos \theta \left( (r \sin \theta)^2 - (r \cos \theta)^2 + 1 \right)}$$

sadeleştirmeler yapılırsa

$$\frac{\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta}{\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta} = \frac{\sin \theta (r^2 \cos 2\theta + 1)}{\cos \theta (r^2 \cos 2\theta - 1)}$$

ve buradan

$$(\sin \theta dr + r \cos \theta d\theta) \cos \theta (r^2 \cos 2\theta - 1) = \sin \theta (r^2 \cos 2\theta + 1) (\cos \theta dr - r \sin \theta d\theta) :$$

çarpımından

$$\begin{aligned} & \sin \theta r^2 \cos \theta \cos 2\theta dr + r^3 \cos \theta \cos 2\theta \cos \theta d\theta - \cos \theta \sin \theta dr - r \cos^2 \theta d\theta \\ & = r^2 \sin \theta \cos 2\theta \cos \theta dr + \sin \theta \cos \theta d\theta - r^3 \sin \theta \cos 2\theta r \sin \theta d\theta - r \sin^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

ve buradan

$$-\sin 2\theta dr + (r^3 - r) \cos 2\theta d\theta = 0$$

değişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denklemi elde edilir. O halde,

$$\frac{2dr}{r^3 - r} = 2 \frac{\cos 2\theta}{\sin 2\theta} d\theta$$

eşitliğinin intergasyonu ile,

$$\ln |c| + \ln |\sin 2\theta| = -2 \int \frac{dr}{r} + \int \frac{dr}{r-1} + \int \frac{dr}{r+1}$$

'den

$$\ln |c \sin 2\theta| = \ln \left| \frac{r^2 - 1}{r^2} \right|$$

veya

$$c \sin 2\theta = \frac{r^2 - 1}{r^2}$$

bulunur.  $c 2r \sin \theta r \cos \theta = r^2 - 1$  denkleminde  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$  ve  $r^2 = x^2 + y^2$  olduğundan,

$$c2xy = x^2 + y^2 - 1$$

genel çözümünü elde edilir.

Soru 9 :  $y(1 + xy) dx + x(1 - xy) dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $xy = u$  ,  $xdy + ydx = du$  dönüşümü uygulayalım. Bu durumda, denklem

$$\frac{u}{x}(1 + u) dx + x(1 - u) \frac{xdu - udx}{x^2} = 0$$

haline gelir. Bu denklem düzenlenirse,

$$\begin{aligned} u(1 + u) dx + (1 - u)(xdu - udx) &= 0 \\ u^2 dx + (1 - u)xdu &= 0 \end{aligned}$$

ayrılabilen diferensiyel denklemini elde edilir. Buradan,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{x} + \frac{1 - u}{u^2} du &= 0 \\ \frac{dx}{x} + \frac{du}{u^2} - \frac{du}{u} &= 0 \end{aligned}$$

integralini alırsak,

$$\begin{aligned} \ln|x| - \frac{1}{u} - \ln|u| &= c \\ \ln\left|\frac{x}{u}\right| &= c + \frac{1}{u} \\ \frac{x}{u} &= e^{c + \frac{1}{u}} \\ \frac{1}{y} &= e^{c + \frac{1}{xy}} \end{aligned}$$

genel çözümünü elde edilir.

### ALIŞTIRMALAR

**Aşağıdaki değişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denklemleri çözünüz.**

- $y' = e^{2x-y}$
- $2x(y + 1) dx - ydy = 0$ ,  $y(0) = -2$
- $x^2yy' = e^y$
- $dr = a(\cos \theta dr + r \sin \theta d\theta)$
- $ye^{2x} dx = (4 + e^{2x}) dy$
- $y \ln x \ln y dx + dy = 0$
- $(1 + \ln x) dx + (1 + \ln y) dy = 0$
- $(e^{2x} + 4) y' = y$

### Cevaplar

a)  $2e^y = e^{2x} + c$

b)  $x^2 = y - \ln|y + 1| + 2$

c)  $x(y + 1) = (1 + cx)e^y$

d)  $r = c(1 - a \cos \theta)$

e)  $c^2y^2 = 4 + e^{2x}$

f)  $x \ln x + \ln|\ln y| = x + c$

g)  $x \ln x + y \ln y = c$

h)  $y^8(1 + 4e^{-2x}) = c^2$

## Homojen Diferensiyel Denklemler

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$  birinci mertebeden diferensiyel denklemini göz önüne alalım. Eğer bu denklemi  $\frac{dy}{dx} + g\left(\frac{y}{x}\right) = 0$  formunda yazabilirsek bu denklem homojen bir diferensiyel denklemdir. Bu tür denklemleri çözmek için  $\frac{y}{x} = u$  dönüşümü uygulanarak denklem ayrılabilir diferensiyel denkleme dönüştürülür.

Soru 1:  $\left(2x \sinh \frac{y}{x} + 3y \cosh \frac{y}{x}\right) dx - 3x \cosh \frac{y}{x} dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözüünüz.**

Çözüm: Denklem birinci dereceden homojen bir diferensiyel denklemdir. Denklem her tarafını  $x$  bölelim ve  $y = ux$ ,  $dy = xdu + udx$  dönüşümünü uygulayalım. Bu durumda denklem,

$$(2 \sinh u + 3u \cosh u) dx - 3 \cosh u (udx + xdu) = 0$$
$$2 \sinh u dx - 3x \cosh u du = 0$$

ayrılabilir diferensiyel denkleme dönüşür.

$$\frac{2}{x} dx - 3 \frac{\cosh u}{\sinh u} du = 0$$

denklemini integre ederek,  $2 \ln x - 3 \ln (\sinh u) = \ln c$  veya  $x^2 = c \sinh^3 \frac{y}{x}$  bulunur.

Soru 2:  $(x - y \ln y + y \ln x) dx + x (\ln y - \ln x) dy = 0$

Çözüm: Denklem düzenlenirse,

$$\left(x + y \ln \frac{x}{y}\right) dx - x \ln \frac{x}{y} dy = 0$$

veya

$$\left(\frac{x}{y} + \ln \frac{x}{y}\right) dx - \frac{x}{y} \ln \frac{x}{y} dy = 0$$

homojen diferensiyel denklemini elde edilir.  $\frac{x}{y} = u$ ,  $dx = udy + ydu$  dönüşümü uygulanırsa,

$$(u + \ln u) (udy + ydu) - u \ln u dy = 0$$
$$u^2 dy + y(u + \ln u) du = 0$$

ayrılabilir diferensiyel denklemini elde edilir.

$$\frac{dy}{y} + \frac{(u + \ln u)}{u^2} du = 0$$

$$\int \frac{(u + \ln u)}{u^2} du = \ln |u| + \int \frac{\ln u}{u^2} du$$

son integralde kısmi integrasyon uygulayalım,  $\ln u = w$ ,  $\frac{1}{u^2} du = dv$ , ve  $\frac{1}{u} du = dw$ ,  $\frac{-1}{u} = v$  dönüşümünden

$$\int \frac{\ln u}{u^2} du = uv - \int v dv = -\frac{\ln u}{u} + \int \frac{du}{u^2} = -\frac{\ln u}{u} - \frac{1}{u}$$

olduğundan  $\frac{dy}{y} + \frac{(u + \ln u)}{u^2} du = 0$  ifadesinin integrasyonundan

$$\ln |y| + \ln |u| - \frac{\ln u}{u} - \frac{1}{u} = c$$

veya  $u = \frac{x}{y}$  için

$$x \ln |x| - y \ln \frac{x}{y} = cx + y$$

genel çözümü bulunur.

Soru 3:  $y\sqrt{x^2 + y^2}dx - x(x + \sqrt{x^2 + y^2})dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm : Her tarafı  $x^2$  ile bölelim. Bu durumda denklem

$$\frac{y}{x} \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} dx - \left(1 + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}\right) dy = 0$$

olur. Bu homojen denklemde,  $y = ux$  ve  $dy = xdu + udx$  dönüşümüyle

$$u\sqrt{1 + u^2}dx - \left(1 + \sqrt{1 + u^2}\right)(xdu + udx) = 0$$

denklemi elde edilir. Gerekli düzenlemeler yapılırsa,

$$\left(1 + \sqrt{1 + u^2}\right)xdu + udx = 0$$

veya

$$\left(\frac{1}{u} + \frac{\sqrt{1 + u^2}}{u}\right) du + \frac{dx}{x} = 0$$

olur.  $\int \frac{\sqrt{1+u^2}}{u} du$  integralini hesaplayalım. Bunun için,  $1+u^2 = v^2$ ,  $2udu = 2v dv$  dönüşümü uygulanırsa,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1+u^2}}{u} du &= \int \frac{v^2}{u^2} dv = \int \frac{v^2 dv}{v^2-1} = \int dv + \int \frac{1}{v^2-1} dv \\ &= v + \frac{1}{2} \left( \int \frac{1}{v-1} dv - \int \frac{1}{v+1} dv \right) \\ &= v + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{v-1}{v+1} \right| = \sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1+u^2}-1}{\sqrt{1+u^2}+1} \right| \end{aligned}$$

bulunur. Buna göre, diferensiyel denklemin çözümü

$$\ln u + \sqrt{1+u^2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{1+u^2}-1}{\sqrt{1+u^2}+1} \right| = \ln cx$$

ve  $\frac{y}{x} = u$  olduğundan,

$$\ln \frac{y}{x} + \frac{1}{x} \sqrt{x^2+y^2} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+y^2}-x}{\sqrt{x^2+y^2}+x} \right| = \ln cx$$

bulunur.

## ALİŞTIRMALAR

**Aşağıdaki homojen diferensiyel denklemleri çözünüz.**

- $(x^2 - xy + y^2) dx - xy dy = 0$
- $(xy) dx + (x^2 + y^2) dy = 0$
- $(xy) dx - (x^2 + 3y^2) dy = 0$
- $(x - y) (4x + y) dx + x (5x - y) dy = 0$
- $\left[ x \csc \left( \frac{y}{x} \right) - y \right] dx + x dy = 0$
- $x dy - y dx - \sqrt{x^2 - y^2} dx = 0$
- $(x^3 + y^3) dx + 3xy^2 dy = 0$
- $y dx = \left( x + \sqrt{y^2 - x^2} \right) dy$

**Cevaplar :**

- $(y - x) e^x = c$
- $y^2 (2x^2 + y^2) = c$
- $x^2 = 6y^2 \ln \left| \frac{y}{c} \right|$

d)  $x(x+y)^2 = c(y-2x)$

e)  $\ln \left| \frac{x}{c} \right| = \cos \left( \frac{y}{x} \right)$

f)  $cx = e^{\arcsin \frac{y}{x}}$

g)  $x^4 + 4xy^3 = c$

h)  $\arcsin \left( \frac{x}{y} \right) = \ln \left| \frac{y}{c} \right|$



## Lineer Diferensiyel denklemler

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$  formundaki lineer diferensiyel denklemlerde  $\eta = e^{\int P(x)dx}$  integrasyon çarpanıdır ve genel çözüm

$$y = e^{-\int P(x)dx} \left[ \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + c \right] \quad ((*L*))$$

eşitliğiyle hesaplanabilir.

Soru 1 .  $y' = \csc x - y \cot x$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $y' + y \cot x = \csc x$  lineer bir diferensiyel denklemdir.  $P(x) = \cot x$  ve  $Q(x) = \csc x$  ifadeleri (\*L\*) denkleminde yerine yazarsak,

$$y = e^{-\int \cot x dx} \left[ \int \csc x e^{\int \cot x dx} dx + c \right]$$

eşitliğinden  $\int \cot x dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x|$  ve  $\csc x = \frac{1}{\sin x}$  olduğu gözönüne alınırsa,

$$y = \frac{1}{\sin x} \left[ \int \frac{1}{\sin x} \sin x dx + c \right] = \frac{1}{\sin x} (x + c)$$

bulunur.

Soru 2 :  $2x(y - x^2) dx + dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm : Denklem düzenlenirse,  $\frac{dy}{dx} + 2xy = 2x^3$  lineer diferensiyel denklemini elde edilir.

$P(x) = 2x$  ve  $Q(x) = 2x^3$  ifadelerini  $y = e^{-\int P(x)dx} \left[ \int Q(x) e^{\int P(x)dx} dx + c \right]$  de yerine yazarsak,

$$y = e^{-\int 2x dx} \left[ \int 2x^3 e^{\int 2x dx} dx + c \right] = e^{-x^2} \left[ \int e^{x^2} 2x^3 dx + c \right]$$

bulunur.  $\int e^{x^2} 2x^3 dx$  integralini hesaplayalım. Bunun için  $x^2 = s$ ,  $2x dx = ds$  dönüşümüyle  $\int e^{x^2} 2x^3 dx = \int e^s s ds$  elde edilir. Kısmi integrasyon uygularsak,  $s = u$ ,  $e^s ds = dv$  den  $e^s = v$  ve  $ds = du$  eşitliklerini yazarsak,

$$\int u dv = uv - \int v du = se^s - \int e^s ds = se^s - e^s$$

elde edilir. Böylece dif. denklemin çözümü,

$$y = e^{-x^2} \left[ x^2 e^{x^2} - e^{x^2} + c \right]$$

elde edilir.

$$\text{Soru 3: } \left. \begin{array}{l} y^2 \frac{dx}{dy} + xy = 2y^2 + 1 \\ y(2) = 1 \end{array} \right\} \text{diferensiyel denklemini çözüünüz.}$$

Çözüm : Her tarafı  $y^2$  ile bölersek  $x$  değişkenine göre lineer  $\frac{dx}{dy} + \frac{x}{y} = \frac{2y^2 + 1}{y^2}$  diferensiyel denklemini elde edilir.  $P(y) = \frac{1}{y}$  ve  $Q(y) = \frac{2y^2 + 1}{y^2}$  olduğundan,

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int \frac{1}{y} dy} \left[ \int \frac{2y^2 + 1}{y^2} e^{\int \frac{1}{y} dy} dy + c \right] \\ x &= \frac{1}{y} \left[ \int \frac{2y^2 + 1}{y^2} y dy + c \right] \\ x &= \frac{1}{y} \left[ \int \left( 2y + \frac{1}{y^2} \right) dy + c \right] = \frac{1}{y} (y^2 + \ln y + c) \end{aligned}$$

bulunur.  $x = 2$  ve  $y = 1$  yazılırsa,  $2 = 1 + 0 + c$  eşitliğinden  $c = 1$  bulunur. Böylece dif. denklemin çözümü  $yx = y^2 + \ln y + 1$  olur.

#### ALİŞTIRMALAR

**Aşağıdaki birinci mertebeden lineer diferensiyel denklemleri çözüünüz.**

- $ydx + (3x - xy + 2) dy = 0$
- $2(y - 4x^2) dx + xdy = 0$
- $y' = x - 2y \cot 2x$
- $n, m \in \mathbb{R}$  olmak üzere  $\frac{dy}{dx} - my = ne^{mx}$
- $dy = (x - 3y) dx$

#### Cevaplar

- $xy^3 = 2y^2 + 4y + 4 + ce^y$
- $x^2y = 2x^4 + c$
- $4y \sin 2x = c + \sin 2x - 2x \cos 2x$
- $y = (nx + c) e^{mx}$
- $9y = 3x - 1 + ce^{-3x}$

## Bernoulli Diferensiyel Denklemi

Soru 1:  $(1 - x^2)y' - xy = axy^2$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm: Her tarafı  $y^2(1 - x^2)$  ile bölersek,

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} - \frac{x}{1 - x^2} y^{-1} = \frac{ax}{1 - x^2}$$

Bernoulli diferensiyel denklemi elde edilir.  $y^{-1} = u$ ,  $-y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile

$$-\frac{du}{dx} - \frac{ux}{1 - x^2} = \frac{ax}{1 - x^2}$$

veya

$$-\frac{du}{dx} = \frac{x(u + a)}{1 - x^2}$$

diferensiyel denklemi elde edilir. Bu değişkenlerine ayrılabilir bir dif. denklemdir. Böylece,

$$\frac{du}{u + a} + \frac{x}{1 - x^2} dx = 0$$

denkleminin integrasyonu ile

$$\ln |u + a| - \frac{1}{2} \ln |1 - x^2| = \ln c$$

veya

$$\frac{u + a}{\sqrt{1 - x^2}} = c$$

olur.  $y^{-1} = u$  yerine yazılarak dif. denklemin çözümü  $y = \left(c\sqrt{1 - x^2} - a\right)^{-1}$  olarak bulunur.

Soru 2:  $\sin y \frac{dy}{dx} = \cos y - x \cos^2 y$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm: Öncelikle  $\cos y = u$ ,  $-\sin y \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümünü uygularsak,

$-\frac{du}{dx} = u - xu^2$  veya  $\frac{du}{dx} + u = xu^2$  bulunur. Bu denklemin her tarafını  $u^2$  ile bölersek,

$$u^{-2} \frac{du}{dx} + u^{-1} = x$$

Bernoulli diferensiyel denklemini elde edilir. O halde  $u^{-1} = v$ ,  $-u^{-2} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{dx}$  dönüşümünden,

$\frac{dv}{dx} - v = -x$  lineer diferensiyel denklemini elde edilir. Böylece,

$$v = e^{-\int(-1)dx} \left[ \int (-x) e^{\int(-1)dx} dx + c \right]$$

eşitliğinden

$$v = e^x \left( -\int x e^{-x} dx + c \right)$$

$\int x e^{-x} dx$  kısmi integrasyon ile  $x = m$ ,  $e^{-x} dx = dn$  ve  $dx = dm$ ,  $-e^{-x} = n$  uygulanırsa  $\int m dn = mn - \int ndm$  den  $\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} + e^{-x}$  bulunur. Böylece

$$v = e^x (x e^{-x} + e^{-x} + c)$$

ve  $\cos y = u$ ,  $u^{-1} = v$  olduğu gözönüne alınır

$$\cos y = (x + 1 + c e^x)^{-1}$$

elde edilir.

Soru 3:  $2x^2 \cot y \frac{dy}{dx} = 5x - 3 \sin y$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm:  $\sin y = u$ ,  $\cos y \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü uygulanırsa,

$$2x^2 \frac{du}{dx} = 5xu - 3u^2$$

elde edilir. Her tarafı  $2x^2$  ile bölersek

$$-\frac{du}{dx} + \frac{5xu}{2x^2} = \frac{3u^2}{2x^2}$$

olur.  $u^2$  ile her tarafı bölersek

$$-u^{-2} \frac{du}{dx} + \frac{5}{2x} u^{-1} = \frac{3}{2x^2}$$

Bernoulli diferensiyel denklemini elde edilir.  $u^{-1} = v$ ,  $-u^{-2} \frac{du}{dx} = \frac{dv}{dx}$  dönüşümünden,

$$\frac{dv}{dx} + \frac{5}{2x} v = \frac{3}{2x^2}$$

lineer diferensiyel denklemini elde edilir. Buradan,

$$v = e^{-\int \frac{5}{2x} dx} \left[ \int \frac{3}{2x^2} e^{\int \frac{5}{2x} dx} dx + c \right] = e^{\ln|x|^{-5/2}} \left[ \int \frac{3}{2x^2} e^{\ln|x|^{5/2}} dx + c \right]$$

eşitliğinden

$$v = x^{-5/2} \left[ \int \frac{3}{2x^2} x^{5/2} dx + c \right]$$

$$v = x^{-5/2} \left[ \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + c \right] = x^{-5/2} (x^{3/2} + c)$$

ve  $(\sin y)^{-1} = u^{-1} = v$  den

$$(\sin y)^{-1} = x^{-1} + cx^{-5/2}$$

bulunur.

Soru 4:  $6y^2 dx = x(2x^3 + y) dy$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :

$\frac{dx}{dy} = \frac{x(2x^3 + y)}{6y^2}$  eşitliğinden  $\frac{dx}{dy} = \frac{x}{6y} + \frac{x^4}{3y^2}$  elde edilir. Her tarafı  $x^{-4}$  ile bölerek

$$x^{-4} \frac{dx}{dy} - x^{-3} \frac{1}{6y} = \frac{1}{3y^2}$$

Bernoulli diferensiyel denklemini elde edilir.  $x^{-3} = u$ ,  $-3x^{-4} \frac{dx}{dy} = \frac{du}{dy}$  dönüşümüyle

$$-\frac{1}{3} \frac{du}{dy} - \frac{u}{6y} = \frac{1}{3y^2}$$

veya

$$\frac{du}{dy} + \frac{u}{2y} = -\frac{1}{y^2}$$

lineer diferensiyel denklemini elde edilir.

$$u = e^{-\int \frac{dy}{2y}} \left[ \int -\frac{1}{y^2} e^{\int \frac{dy}{2y}} dy + c \right]$$

eşitliğinden

$$u = y^{-1/2} \left[ \int y^{-3/2} dy + c \right] = y^{-1/2} \left[ -2y^{-1/2} + c \right]$$

ve  $x^{-3} = u$  eşitliğinden

$$x^{-3} = y^{-1/2} [-2y^{-1/2} + c]$$

bulunur.

Soru 5:  $y' - 2xy = 2xe^{x^2} \sqrt{y}$ ,  $y(0) = 1$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Soru 6:  $xy' + y = x^2y^2 \sin x$ ,  $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Soru 7:  $yy' + y^2 \cot x = \csc^2 x$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm:  $y \frac{dy}{dx} + y^2 \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{\sin^2 x}$  denklemi bir Bernoulli diferensiyel denklemdir.  $y^2 = u$ ,

$2y \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$  dönüşümü ile denklem

$$\frac{du}{dx} + 2u \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{2}{\sin^2 x}$$

lineer diferensiyel denkleme dönüşür.  $P(x) = 2 \frac{\cos x}{\sin x}$  ve  $Q(x) = \frac{2}{\sin^2 x}$  olduğundan,

$$u = e^{-\int 2 \frac{\cos x}{\sin x} dx} \left[ \int \frac{2}{\sin^2 x} e^{\int 2 \frac{\cos x}{\sin x} dx} dx + c \right]$$

eşitliğinden

$$u = \sin^{-2} x \left[ \int 2 dx + c \right]$$
$$y^2 \sin^2 x = 2x + c$$

bulunur.

## ALİŞTIRMALAR

**Aşağıdaki verilen diferensiyel denklemlerin çözümünü bulunuz.**

- $y' = y - xy^3 e^{-2x}$
- $y' \tan x \sin 2y = \sin^2 x + \cos^2 y$
- $2x^3 y' = y(y^2 + 3x^2)$
- $y' = 1 + 6xe^{x-y}$
- $y(6y^2 - x - 1) dx + 6y^3 dx = 0$

- $e^{2x} = y^2(x^2 + c)$
- $(\sin^2 x + 3 \cos^2 y) \sin x = c$
- $y^2(c - x) = x^3$
- $e^{x-y} = 3x^2 + c$
- $y^2(6 + ce^{-x}) = x$

## İntegrasyon Çarpanının Belirlenmesi

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$  diferensiyel denklemi için

a)  $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = f(x)$ , sadece  $x$  'e bağlı bir fonksiyon ise  $\eta = e^{\int f(x) dx}$  bir integrasyon çarpanıdır.

b)  $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} = -g(y)$ , sadece  $y$  'ye bağlı bir fonksiyon ise  $\eta = e^{\int g(y) dy}$  bir integrasyon çarpanıdır.

c)  $M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$  denklemi homojen ise  $\eta = \frac{1}{Mx + Ny}$  bir integrasyon çarpanıdır.

Soru 1 :  $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y) dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x) dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözüünüz.**

Çözüm :  $\left. \begin{array}{l} \frac{\partial M}{\partial y} = 8xy^3e^y + 2xy^4e^y + 6xy^2 + 1 \\ \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy^4e^y - 2xy^2 - 3 \end{array} \right\} \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$  olduğundan tam diferensiyel değil.

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 8xy^3e^y + 8xy^2 + 4$$

ve

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} = \frac{4}{y} = -g(y) \text{ (Sadece } y \text{ 'ye bağlı bir fonksiyon)}$$

O halde,

$$\eta = e^{\int g(y) dy} = e^{\int \frac{-4}{y} dy} = e^{-4 \ln|y|} = \frac{1}{y^4}$$

integrasyon çarpanıdır. Denklemi  $\eta = \frac{1}{y^4}$  ile çarpılırsa,

$$\left( 2xe^y + 2\frac{x}{y} + \frac{1}{y^3} \right) dx + \left( x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - 3\frac{x}{y^4} \right) dy = 0$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. O halde öyle bir  $U(x, y)$  fonksiyonu vardır ki,  $\frac{\partial U}{\partial x} = M$  'dir.

$$U(x, y) = \int \left( 2xe^y + 2\frac{x}{y} + \frac{1}{y^3} \right) dx = x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} + \varphi(y)$$

olduğundan,

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2e^y - \frac{x^2}{y^2} - 3\frac{x}{y^4} + \varphi'(y) = N$$

eşitliğinden  $\varphi'(y) = 0$  ve  $\varphi(y) = c$  bulunur. Dolayısıyla, diferensiyel denklemin çözümü

$$x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} = c$$

bulunur.

Soru 2:  $(x^2 + y^2 + 2x) dx + 2ydy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm:  $\left. \begin{array}{l} \frac{\partial M}{\partial y} = 2y \\ \frac{\partial N}{\partial x} = 0 \end{array} \right\} \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$  olduğundan tam diferensiyel değil.

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 2y$$

ve

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = 1 = f(x) \text{ (Sadece } x \text{ 'e bağlı bir fonksiyon)}$$

O halde,

$$\eta = e^{\int g(x)dx} = e^{\int 1 dx} = e^x$$

integrasyon çarpanıdır. Denklemi  $\eta = e^x$  ile çarpılırsa,

$$e^x (x^2 + y^2 + 2x) dx + 2e^x y dy = 0$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. O halde öyle bir  $U(x, y)$  fonksiyonu vardır ki,  $\frac{\partial U}{\partial y} = N$  'dir.

$$U(x, y) = \int 2ye^y dy = y^2e^x + \varphi(x)$$

olduğundan,

$$\frac{\partial U}{\partial x} = y^2e^x + \varphi'(x) = M$$



eşitliğinden

$$\varphi'(x) = e^x(x^2 + 2x) \text{ ve } \varphi(x) = \int e^x(x^2 + 2x) dx = \underbrace{\int e^x x^2 dx}_{(***)} + \int e^x 2x dx$$

olur. (\*\*\*) için  $x^2 = u$ ,  $2x dx = du$ ,  $e^x dx = dv$  ve  $e^x = v$  denilirse,

$$\varphi(x) = \int e^x(x^2 + 2x) dx = \int e^x x^2 dx + \int e^x 2x dx = x^2 e^x - \int e^x 2x dx + \int e^x 2x dx = x^2 e^x$$

bulunur. Dolayısıyla, diferensiyel denklemin çözümü

$$U(x, y) = y^2 e^x + x^2 e^x = c$$

bulunur.

Soru 3:  $(x^2 y - 2xy) dx + (3x^2 y - x^3) dy = 0$  diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm:  $\left. \begin{array}{l} \frac{\partial M}{\partial y} = x^2 - 4xy \\ \frac{\partial N}{\partial x} = 6xy - 3x^2 \end{array} \right\} \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$  olduğundan tam diferensiyel değil. Ayrıca verilen denklem homojen bir diferensiyel denklemdir. O halde, integrasyon çarpanı

$$\eta = \frac{1}{xM + yN} = \frac{1}{x(x^2 y - 2xy) + y(3x^2 y - x^3)} = \frac{1}{x^2 y^2}$$

olur. Denklemi integrasyon çarpanı ile çarpıp düzenlersek,

$$\frac{x - 2y}{xy} dx + \frac{3y - x}{y^2} dy = 0$$

tam diferensiyel denklemi elde edilir. O halde öyle bir  $U(x, y)$  fonksiyonu vardır ki,  $\frac{\partial U}{\partial x} = M$  'dir.

$$U(x, y) = \int \left( \frac{x - 2y}{xy} \right) dx = \int \left( \frac{1}{y} - \frac{2}{x} \right) dx = \frac{x}{y} - 2 \ln |x| + \varphi(y)$$

olduğundan,

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + \varphi'(y) = N$$

eşitliğinden  $\varphi'(y) = \frac{3}{y}$  ve  $\varphi(y) = 3 \ln |y|$  bulunur. Dolayısıyla, diferensiyel denklemin çözümü

$$\frac{x}{y} - 2 \ln |x| + 3 \ln |y| = c$$

veya

$$\frac{x}{y} + \ln \frac{y^3}{x^2} = c$$

bulunur.

### ALİŞTIRMALAR

**Aşağıdaki diferensiyel denklemler için integrasyon çarpanını bulularak, diferensiyel denklemini çözünüz**

a)  $(4xy + 3y^2 - x) dx + x(x + 2y) dy = 0$

b)  $y(x + y + 1) dx + x(x + 3y + 2) dy = 0$

c)  $y(x + y) dx + (x + 2y - 1) dy = 0$

a)  $\eta = x^2, x^3(4xy + 4y^2 - x) = c$

b)  $\eta = y, xy^2(x + 2y + 2) = c$

c)  $\eta = e^x, y(x + y - 1) = ce^{-x}$

## İki deęişkenli Lineer Katsayılı Diferensiyel Denklemlerin Çözümü

Soru 1 :  $(x + 2y - 4)dx - (2x + y - 5)dy = 0$ . **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $\left. \begin{array}{l} x + 2y - 4 = 0 \\ 2x + y - 5 = 0 \end{array} \right\}$  denklem sisteminin çözümünden  $x = 2$  ve  $y = 1$  bulunur.

Dolayısıyla,  $x = u + 2$  ve  $y = v + 1$  dönüşümü yapılırsa, diferensiyel denklem  $(u + 2v) du - (2u + v) dv = 0$  homojen diferensiyel denklemine dönüşür.

O halde,  $\frac{u}{v} = z$ ,  $du = z dv + v dz$  dönüşümü yaparsak,

$$(z + 2)(z dv + v dz) - (2z + 1) dv = 0$$

veya düzenlenirse

$$(z^2 - 1) dv + v(z + 2) dz = 0$$

deęişkenlerine ayrılabilir diferensiyel denklem elde edilir. Yani,

$$\frac{dv}{v} + \frac{(z + 2) dz}{z^2 - 1} = 0$$

olur. Bu denklemi,

$$\frac{dv}{v} + \frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z + 1} = 0$$

şeklinde yazarsak,  $A + B = 1$  ve  $A - B = 2$  denklemlerinden  $A = \frac{3}{2}$  ve  $B = -\frac{1}{2}$  bulunur.

O halde integrasyon ile

$$\ln |v| + \frac{3}{2} \ln |z - 1| - \frac{1}{2} \ln |z + 1| = \ln |c|$$

veya

$$v^2 (z - 1)^3 = c(z + 1)$$

elde edilir.  $z = \frac{u}{v} = \frac{x - 2}{y - 1}$  yerine yazarsak

$$(x - y - 1)^3 = c(x + y - 3)$$

çözümü elde edilir.

Soru 2 :  $(2x + 3y - 1) dx + (2x + 3y + 2) dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $\left. \begin{array}{l} 2x + 3y - 1 = 0 \\ 2x + 3y + 2 = 0 \end{array} \right\}$  denklem sisteminin katsayıları orantılı olduğundan bu doğrular paraleldir ve sistemin çözümü yoktur. Dolayısıyla bir önceki soruda uygulanan dönüşüm uygulanamaz. Burada,  $2x + 3y = v$ ,  $2dx + 3dy = dv$  dönüşümünü uygulanırsa,

$$(v - 1) dx + (v + 2) \left( \frac{dv - 2dx}{3} \right) = 0$$

veya

$$(v - 7) dx + (v + 2) dv = 0$$

ayrılabilir diferensiyel denklemi elde edilir.

$$\begin{aligned} dx + \frac{v - 7 + 9}{v - 7} dv &= 0 \\ dx + \left( 1 + \frac{9}{v - 7} \right) dv &= 0 \\ x + v + 9 \ln |v - 7| &= c_1 \end{aligned}$$

olur. Böylece,

$$x + y + 3 \ln |2x + 3y - 7| = c$$

genel çözümü elde edilir.

Soru 3:  $(2x^3 + 3y^2 - 7) 3x^2 dx - (3x^3 + 2y^2 - 8) y dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm: Öncelikle  $x^3 = u$  ve  $y^2 = v$  dönüşümü uygulayalım. Bu durumda denklem

$$(2u + 3v - 7) du - (3u + 2v - 8) dv = 0$$

olur.  $\left. \begin{array}{l} 2u + 3v - 7 = 0 \\ 3u + 2v - 8 = 0 \end{array} \right\}$  denklem sisteminin çözümünden,  $u = 2$  ve  $v = 1$  bulunur. O halde  $u = m + 2$  ve  $v = n + 1$  dönüşümü uygulanırsa,

$$(2m + 3n) dm - (3m + 2n) dn = 0$$

homojen diferensiyel denklemi elde edilir.  $\frac{m}{n} = z$  ve  $dm = z dn + n dz$  dönüşümünden,

$$(2z + 3) (z dn + n dz) - (3z + 2) dn = 0$$

veya

$$2(z^2 - 1) dn + (2z + 3) n dz = 0$$

ayrılabilir diferensiyel denklemi elde edilir.

$$\begin{aligned} \frac{2}{n} dn + \frac{2z + 3}{z^2 - 1} dz &= 0 \\ \frac{2}{n} dn - \frac{1}{2} \frac{dz}{z + 1} + \frac{5}{2} \frac{dz}{z - 1} &= 0 \end{aligned}$$

denkleminin integrasyonu ile

$$4 \ln |n| - \ln |z + 1| + 5 \ln |z - 1| = \ln |c|$$

bulunur.  $z = \frac{u - 2}{v - 1} = \frac{x^3 - 2}{y^2 - 1}$  yerine yazılıp gerekli düzenlemeler yapılırsa,

$$(x^3 - y^2 - 1)^5 = c(x^3 + y^2 - 3)$$

genel çözümü elde edilir.

Soru 4:  $(x - 2 \sin y + 3) dx - (2x - 4 \sin y - 3) \cos y dy = 0$  **diferensiyel denklemini çözünüz.**

Çözüm :  $\sin y = u$  ,  $\cos y dy = du$  dönüşümü yapılırsa,

$$(x - 2u + 3) dx - (2x - 4u - 3) du = 0$$

elde edilir.  $\left. \begin{array}{l} x - 2u + 3 = 0 \\ 2x - 4u - 3 = 0 \end{array} \right\}$  denklem sisteminin katsayıları orantılı olduğundan bu

doğrular paraleldir ve sistemin çözümü yoktur. Bu durumda  $x - 2u = v$  ,  $1 - 2 \frac{du}{dx} = \frac{dv}{dx}$  dönüşümü uygulayabiliriz. Bu durumda

$$\begin{aligned} (v + 3) dx - (2v - 3) du &= 0 \\ \frac{2v + 6}{2v - 3} &= 2 \frac{du}{dx} = 1 - \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

denkleminde

$$\begin{aligned} \frac{2v - 3}{4v + 3} dv &= dx \\ \left(1 - \frac{9}{4v + 3}\right) dv &= 2dx \end{aligned}$$

olur. Bu denklemin integrasyonu ile

$$v - \frac{9}{4} \ln |4v + 3| = 2x + c_1$$

veya

$$4v - 9 \ln |4v + 3| = 8x + c$$

olur. Başlangıçta yaptığımız dönüşümleri gözönüne alırsak

$$4(x - 2 \sin y) - 9 \ln |4(x - 2 \sin y) + 3| = 8x + c$$

veya

$$4x + 8 \sin y + 9 \ln(4x - 8 \sin y + 3) = c$$

bulunur.

Soru 5:  $(x - y - 1) dx - (x + 4y - 1) dy = 0$  diferensiyel denklemini çözüünüz.

Çözüm:

Soru 6:  $y' = \frac{2x + y - 1}{4x + 2y + 5}$  diferensiyel denklemini çözüünüz.

### ALİŞTIRMALAR

**Aşağıdaki diferensiyel denklemleri çözüünüz**

- $(2x - y) dx + (4x + y - 6) dy = 0$
- $(x - 4y - 3) dx - (x - 6y - 5) dy = 0$
- $(x - y + 2) dx + 3dy = 0$
- $(x + y - 1) dx + (2x + 2y + 1) dy = 0$
- $(x - 1) dx - (3x - 2y - 5) dy = 0, y(2) = 1$

- $(x + y - 3)^2 = c(2x + y - 4)^2$
- $(x - 2y - 1)^2 = c(x - 3y - 2)$
- $x + c = 3 \ln|x - y + 5|$
- $x + 2y + c = 3 \ln|x + y + 2|$
- $(2y - x + 3)^2 = 9(y - x + 2)$

## Riccati Diferensiyel Denklemi

$y' = A(x)y^2 + B(x)y + c(x)$  tipindeki diferensiyel denklemlerde  $y_1$  bir özel çözüm verilirse  $y = y_1 + \frac{1}{v}$  dönüşümü yapılarak genel çözüm bulunur.

Soru 1 :  $y' + y^2 - 3y \tan x + \tan^2 x - 1 = 0$  **diferensiyel denkleminin bir özel çözümü**  $y = \tan x$  ise genel çözümü bulunuz.

Çözüm :  $y = \tan x + \frac{1}{v}$  ve  $\frac{dy}{dx} = (1 + \tan^2 x) - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$  dönüşümünü uygulayalım. Bu durumda denklem

$$(1 + \tan^2 x) - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} + \tan^2 x + \frac{1}{v^2} + \frac{2}{v} \tan x - 3 \tan^2 x - \frac{3}{v} \tan x + \tan^2 x - 1 = 0$$

olur. Sadeleştirmeler yapılırsa,

$$-\frac{1}{v} \frac{dx}{dx} + \frac{1}{v} = \tan x$$

veya

$$\frac{dv}{dx} + v \tan x = 1$$

lineer diferensiyel denklemi elde edilir.  $P(x) = \tan x$  ve  $Q(x) = 1$  olduğundan,

$$v = e^{-\int \tan x dx} \left[ \int e^{\int \tan x dx} dx + c \right] = \sin x \left[ \int \frac{dx}{\sin x} + c \right]$$

olur.

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x}{1 - \cos^2 x} dx = \int \frac{-du}{1 - u^2} = -\frac{1}{2} \int \frac{du}{1 - u} - \frac{1}{2} \int \frac{du}{u + 1} = -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - u}{1 + u} \right|$$

Buna göre,

$$v = \sin x \left( -\frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \right| + c \right) = \frac{1}{y - \tan x}$$

bulunur.

Soru 2 :  $y' = y^2 \csc^2 x + y \cot x - 1$  **diferensiyel denkleminin bir özel çözümü**  $y = \sin x$  ise genel çözümü bulunuz.

Çözüm :  $y = \sin x + \frac{1}{v}$  ve  $\frac{dy}{dx} = \cos x - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$  dönüşümünü uygulayalım. Bu durumda denklem

$$\cos x - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} = \left( \sin^2 x + \frac{1}{v^2} + 2 \frac{\sin x}{v} \right) \frac{1}{\sin^2 x} + \left( \sin x + \frac{1}{v} \right) \frac{\cos x}{\sin x} - 1$$

veya

$$\cos x - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} = 1 + \frac{1}{v^2 \sin^2 x} + \frac{2}{v \sin x} + \cos x + \frac{\cos x}{v \sin x} - 1$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$\frac{dv}{dx} + \left( \frac{2 + \cos x}{\sin x} \right) v = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

lineer diferensiyel denklemi elde edilir.

$$P(x) = \frac{2 + \cos x}{\sin x} \text{ ve } Q(x) = \frac{-1}{\sin^2 x}$$

olduğundan,

$$e^{-\int \frac{2+\cos x}{\sin x} dx} = e^{-\int \left( \frac{\cos x}{\sin x} + \frac{2}{\sin x} \right) dx} = e^{-(\ln|\sin x| + \ln|1-\cos x| - \ln|1+\cos x|)} = \frac{(1 + \cos x)^2}{\sin^3 x}$$

bulunur. O halde,

$$v = \frac{(1 + \cos x)^2}{\sin^2 x} \left[ \int \frac{-1}{\sin^2 x} \frac{\sin^3 x}{(1 + \cos x)^2} dx + c \right]$$

olur.

$$\int \frac{-\sin x}{(1 + \cos x)^2} dx = \int \frac{dw}{w^2} = \frac{w^{-3}}{-3} = \frac{(1 + \cos x)^{-3}}{-3} \text{ ve } v = \frac{1}{y - \sin x}$$

olduğu gözönüne alınırsa,

$$\frac{1}{y - \sin x} = \frac{(1 + \cos x)^2}{\sin^2 x} \left[ \left( \frac{(1 + \cos x)^{-3}}{-3} \right) + c \right]$$

veya

$$\frac{3}{y - \sin x} = -\frac{(1 + \cos x)^{-1}}{\sin^2 x} + c(1 + \cos x)^2$$

genel çözümü bulunur.

Soru 3:  $y' = \frac{-4}{\sin x} + (3 - \cot x)y + y^2 \sin x$  **diferensiyel denkleminin bir özel**

**çözümü**  $y = \frac{1}{\sin x}$  ise genel çözümü bulunuz.

Çözüm:  $y = \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{v}$  ve  $\frac{dy}{dx} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx}$  dönüşümünü uygulayalım. Bu durumda denklem



$$\frac{-\cos x}{\sin^2 x} - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} = \frac{-4}{\sin x} + (3 - \cot x) \left( \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{v} \right) + \left( \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{v} \right)^2 \sin x$$

veya sağ taraf düzenlenirse

$$\frac{-\cos x}{\sin^2 x} - \frac{1}{v^2} \frac{dv}{dx} = \frac{5}{v} - \frac{\cot x}{\sin x} - \frac{\cot x}{v} + \frac{\sin x}{v^2}$$

olur. Gerekli sadeleştirmeler yapılırsa,

$$\frac{dv}{dx} + (5 - \cot x) v = -\sin x$$

lineer diferensiyel denklemi elde edilir.  $P(x) = 5 - \cot x$  ve  $Q(x) = -\sin x$  olduğundan,

$$\begin{aligned} v &= e^{-\int (5 - \cot x) dx} \left[ \int (-\sin x) e^{\int (5 - \cot x) dx} dx + c \right] \\ v &= e^{-5x + \ln|\sin x|} \left[ \int (-\sin x) e^{5x - \ln|\sin x|} dx + c \right] \\ v &= \sin x e^{-5x} \left[ \int -e^{5x} dx + c \right] \\ v &= \sin x e^{-5x} \left[ -\frac{e^{5x}}{5} + c \right] \end{aligned}$$

ve  $v = \frac{\sin x}{y \sin x - 1}$  olduğu gözönüne alınırsa

$$\frac{1}{y \sin x - 1} = -\frac{1}{5} + c e^{-5x}$$

genel çözümü elde edilir.

## Eğri ailelerinin yörüngelerinin denkleminin bulunması

Soru 1:  $2xyy' = y^2 - x^2$  diferensiyel denkleminin integral eğrilerinin ortogonal yörüngelerinin denklemini bulunuz.

Çözüm:  $y'$  yerine  $-\frac{1}{y'}$  yazalım. Bu durumda,  $2xy = (x^2 - y^2)y'$  homojen diferensiyel denklemi elde edilir. Bu denklemin her tarafı  $x^2$  ile bölünürse

$$2\frac{y}{x} = \left(1 - \frac{y^2}{x^2}\right) \frac{dy}{dx}$$

olur.  $\frac{y}{x} = u$ ,  $\frac{dy}{dx} = u + x\frac{du}{dx}$  dönüşümü uygulanırsa,

$$\begin{aligned} 2u &= (1 - u^2) \left(u + x\frac{du}{dx}\right) \\ 2u &= u + x\frac{du}{dx} - u^3 - xu^2\frac{du}{dx} \\ u^3 + u &= x(1 - u^2)\frac{du}{dx} \\ \frac{dx}{x} &= \frac{(1 - u^2) du}{u^3 + u} \end{aligned}$$

ayrılabilir diferensiyel denklem elde edilir.

$$\frac{1 - u^2}{u^3 + u} = \frac{A}{u} + \frac{Bu + C}{u^2 + 1} = \frac{u^2(A + B) + Cu + A}{u^3 + u}$$

eşitliğinden  $C = 0$ ,  $A = 1$  ve  $B = -2$  olduğu görülür. Dolayısıyla

$$\int \frac{(1 - u^2) du}{u^3 + u} = \int \frac{du}{u} - \int \frac{2udu}{u^2 + 1} = \ln|u| - \ln|u^2 + 1| = \ln \left| \frac{u}{u^2 + 1} \right|$$

olur. Böylece diferensiyel denklemin genel çözümü

$$\ln|x| + \ln|c| = \ln \left| \frac{u}{u^2 + 1} \right| \text{ veya } cx = \frac{u}{u^2 + 1} \text{ 'dir.}$$

Ayrıca,  $\frac{y}{x} = u$  olduğundan genel çözüm  $c(y^2 + x^2) = y$  olarak bulunur.

Soru 2: Kutupsal koordinatlarda verilen  $r^2 = 2c^2 \cos 2\theta$  lemniskat ailesinin ortogonal yörüngelerinin denklemini bulunuz.

Çözüm: Öncelikle  $r^2 = 2c^2 \cos 2\theta$  denkleminde sabit sayıyı yok ederek bu eğri ailesinin diferensiyel denklemini oluşturalım. bunun için türev alırsak,

$$2rr' = -4c^2 \sin 2\theta \text{ ve } c^2 = -\frac{rr'}{2 \sin 2\theta}$$

ifadesi  $r^2 = 2c^2 \cos 2\theta$  denkleminde yerine yazılırsa,

$$r = -\frac{r'}{\sin 2\theta} \cos 2\theta$$

veya

$$\frac{r'}{r} = \frac{-\sin 2\theta}{\cos 2\theta}$$

diferensiyel denklemi elde edilir. Kutupsal koordinatlarda verilen eğrilerin ortogonal yörüngelerinin denklemini bulmak için  $r'$  yerine  $\frac{-r^2}{r'}$  yazılır. O halde

$$\frac{-r^2}{rr'} = -\tan 2\theta$$

$$\frac{r}{r'} = \tan 2\theta$$

$$\frac{dr}{r} = \cot 2\theta d\theta$$

$$2 \ln |r| = \ln |\sin 2\theta| + 2 \ln |c|$$

$$r^2 = c^2 \sin 2\theta$$

olarak bulunur.

## ALIŞTIRMALAR

**1. Aşağıdaki dik koordinatlarda verilen eğri ailelerinin ortogonal yörüngelerinin diferensiyel denklemlerini bulunuz.**

a)  $y^2 = cx^3$

b)  $x = ce^{y^2}$

c)  $x^2 - y^2 = cx$

d)  $y^2 = \frac{x^3}{a-x}$

e)  $y = c_1(\sec x + \tan x)$

**2. Aşağıdaki kutupsal koordinatlarda verilen eğri ailelerinin ortogonal yörüngelerinin diferensiyel denklemlerini bulunuz.**

a)  $r = a(1 + \cos \theta)$

b)  $r = a \cos^2 \theta$

c)  $r^2 = a \sin 2\theta$

d)  $r^2 \cos 2\theta = c_1$

e)  $r = a(1 + \sin^2 \theta)$

**Cevaplar**

1. a)  $2x^2 + 3y^2 = m^2$

b)  $y = c_1 e^{-x^2}$

c)  $y(y^2 + 3x^2) = c_1$

d)  $(x^2 + y^2)^2 = b(2x^2 + y^2)$

e)  $y^2 = 2(c_2 - \sin x)$

2. a)  $r = b(1 - \cos \theta)$

b)  $r^2 = b \sin \theta$

c)  $r^2 = b \cos 2\theta$

d)  $r^2 \sin 2\theta = c_2$

e)  $r^2 = b \cos \theta \cot \theta$

## Clairaut Diferensiyel Denklemi

Soru :  $y = xy' + (y')^2 - 2y' + 1$  diferensiyel denklemini çözünüz.

Çözüm :  $y' = p$  yazılırsa,

$$y = xp + p^2 - 2p + 1 = xp + (p - 1)^2 \quad (*)$$

olur. Türev alınırsa

$$\begin{aligned} p &= p + xp' + 2(p - 1)p' \\ p' [x + 2(p - 1)] &= 0 \end{aligned}$$

olur.

i)  $p' = 0$  ise  $p = c$  olur Bu (\*) da yerine yazılırsa,

$$y = cx + (c - 1)^2$$

doğru ailesi bulunur. (Genel çözüm)

ii)  $[x + 2(p - 1)] = 0$  ise  $x = 2(1 - p)$  ifadesi (\*) 'da yerine yazılırsa

$$y = 2p(1 - p) + (p - 1)^2 = -p^2 + 1$$

olur.  $\left. \begin{array}{l} x = 2(1 - p) \\ y = -p^2 + 1 \end{array} \right\}$  denklemlerinden  $p$  yok edilerek

$$(x - 2)^2 + 4(y - 1) = 0$$

parabol ailesi bulunur. (Tekil çözüm)

Devam Edecek