Taurador®

5mg/ml **SOLUCION POUR-ON** para Bovinos

Doramectina

Especialmente indicado para

PIOJILLOS RESISTENTES Y SARNA

¡50 DÍAS DE PERSISTENCIA!



RENDIMIENTO CONSTANTE -RESULTADOS VISIBLES

Taurador® 5 mg/ml solución pour-on para bovino. **Composición:** Cada ml contiene: Doramectina 5 mg. **Especies de destino:** Bovino. **Indicaciones de uso:** Tratamiento de infección por nematelmintos gastrointestinales, vermes pulmonares, vermes oculares, barros, piojos chupadores y masticadores, ácaros de la sarna y la mosca de los cuernos en ganado bovino. **Posología y vía de administración:** Uso por vía tópica, solución para unción dorsal continua. Un único tratamiento de 1 ml (5 mg de doramectina) por 10 kg de peso vivo (basándose en la recomendación de un nivel de dosis de 500 µg/kg). **Tiempo de espera:** Carne: 35 días. No usar en animales en lactación cuya leche se destine para consumo humano. No usar en novillas o vacas gestantes cuya leche se destine para consumo humano, en los 2 meses previos al parto. **Titular de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories (Ireland) Ltd. **Nº de Autorización:** 2913 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
karizoo@alivira.es
www.alivira.es

ALIVIRA