

Biológicos

Antiparasitarios

Rehidratantes



40 ML



Ficha Técnica



Coxevac

Única vacuna contra la fiebre Q registrada en España

Contiene *Coxiella burnetii* inactivada, cepa Nine Mile (≥ 72 Unidades FQ). Única vacuna de fase 1 para fiebre Q. Comercializada a nivel mundial, con excelentes resultados de eficacia en los planes de lucha que se están llevando a cabo a nivel mundial frente a fiebre Q.

Ovino y caprino: 2 ml. **Vacuno:** 4 ml. Vía subcutánea, en la región del cuello.

Cevac Chlamydophila

Vacuna atenuada para la prevención del aborto enzoótico producido por *Chlamydophila abortus* tanto en ovino como en caprino

Contiene una cepa atenuada de *Chlamydophila abortus* (cepa 1B termosensible) que permite crear una protección potente en los animales correctamente vacunados.

Una dosis de 2ml, 1 ó 2 meses antes de la estación de apareamiento. Vía subcutánea.

Cevac Clostridium

Vacuna frente a enfermedades clostridiales diseñada para ovino

Vacuna indicada en ovino frente a enterotoxemias provocadas por *C. perfringens* tipo A, B, C y D, *C. sordellii* y frente a las infecciones clostridiales provocadas por *C. novyi* tipo B, *C. septicum*, *tetani* y *chauvoei*.

Dos dosis de 2 ml con 4 semanas de intervalo (consultar ficha técnica). **Revacunación:** la vacunación de refuerzo debe programarse 2 a 4 semanas antes de cualquier periodo de riesgo. Vía subcutánea, en la zona axilar detrás del codo.

Eprecis

Eprinomectina inyectable indicada para bovino, ovino y caprino. 0 horas de retirada en leche



Solución inyectable para bovino, ovino y caprino como tratamiento de infestaciones por parásitos internos y externos sensibles a la eprinomectina.

Una única administración. Una dosis de 0,2 mg de eprinomectina por kg de peso vivo; equivalente a 0,1 ml del medicamento veterinario por 10 kg de peso vivo. Vía subcutánea.

100 ML / 250 ML



Ficha Técnica



Rehydion Gel

Complemento dietético en gel oral

Para la prevención y tratamiento de los trastornos digestivos (diarrea) y en su convalecencia.

Para mantener los niveles de electrolitos, administrar 2 L de leche (o agua) con Rehydion gel, dos veces al día, durante 2 o más días si fuera necesario.

Uso: Mezclar 20 ml de Rehydion gel con 1L de agua (o de leche) templada.



320 ML



Ficha Técnica



— DESCUBRE — NUESTROS SERVICIOS



Análisis y asesoramiento frente a abortos



Análisis de parásitos gastrointestinales



Asesoramiento reproductivo



Análisis de presencia y circulación de *Coxiella burnetii*



Aporta más valor en cada granja

9-RU-GE-25-17731



Juntos, más allá de la salud animal

Ceva Salud Animal

Avda. Diagonal 609-615. 9o planta.
08028 Barcelona. España

www.ceva.es
ceva.salud-animal@ceva.com

VADEMECUM RUMIANTES



