

Dinalgen®

150 mg/ml

Solución Inyectora

El **antiinflamatorio**
de **elección** en
vacuno



Ecuphar
An Animalcare Company

Dinalgen® tu aliado en el **bienestar animal**


Dinalgen® está indicado en la **reducción de la inflamación, fiebre y dolor** en:



Mamitis




Coじeras



Enfermedad respiratoria

Dinalgen® 15%: el antiinflamatorio de elección en vacuno

- ✓ Por su doble mecanismo de acción



- ✓ Porque en bovino es posible aplicarlo vía INTRAMUSCULAR o INTRAVENOSA



- ✓ Por su Seguridad: 0 horas en leche
2 días en carne

- ✓ Por su menor volumen de inyección

	Dosis	ml/Vaca (600kg)
Dinalgen®	1 ml/50 kg	12
Flunixino	2 ml/45 kg	27
Meloxicam	2,5 ml/100 kg	15
Carprofeno	1 ml/35 kg	17
Ác. Tolfenámico	1 ml/20 kg	30
Ketoprofeno 10%	3 ml/100 kg	18

Dinalgen®

150 mg/ml

Solución Inyectable



✓ Efecto inmediato sobre la fiebre, la inflamación y el dolor: MEJORA EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES

✓ PERÍODO DE SUPRESIÓN:
Leche 0 horas
Carne 2 días
✓ Administración por VÍA INTRAVENOSA o INTRAMUSCULAR en BOVINO

✓ Bajo volumen de dosificación: 1ml/50kg p.v/día
✓ Mejora el índice de curación en MAMITIS y COJERAS

Denominación: Dinalgen 150 mg/ml solución inyectable para bovino, porcino y equino. **Composición:** Cada ml contiene ketoprofeno 150 mg. **Indicaciones y especies de destino:** **Bovino:**- Reducción de la inflamación y del dolor asociado con trastornos musculoesqueléticos cojera tras el parto.- Reducción de la fiebre asociada con la enfermedad respiratoria bovina.- Reducción de la inflamación, fiebre y dolor en mastitis clínica aguda. **Porcino:** Reducción de la fiebre en casos de enfermedad respiratoria y Síndrome de DisgalaxiaPostparto -SDPP-(síndrome de Metritis Mastitis Agalaxia) en cerdas, en combinación contratiempos antiinfeccioso, cuando proceda. **Equino:** Reducción de la inflamación y el dolor asociados con trastornos osteoarticulares y músculo esqueléticos (cojera, laminitis, osteoartritis, sinovitis, tendinitis, etc.). Reducción del dolor e inflamación postoperatorios.- Reducción del dolor visceral asociado con cólico. **Posología y vías de administración:** **Bovino:** Administrar el medicamento por vía intravenosa o intramuscular a 1 ml/50 kg p.v./día de medicamento. La duración del tratamiento es de 1-3 días. **Porcino:** Administrar el medicamento por vía intramuscular a 1 ml/50 kg p.v./día de medicamento, administrado una única vez. **Equino:** Administrar el medicamento por vía intravenosa o intramuscular. Leer el prospecto antes de usar. **Tiempo de espera:** -Bovino: carne 2 días, leche cero horas; -Equino: carne 1 día, normalmente es suficiente. **Modo y vías de administración:** Vía intravenosa o intramuscular. Leer el prospecto antes de usar. **Imagen de esperas:** -Bovino: carne 2 días. Conservar el vial en el embalaje exterior. Uso veterinario. **Nombre del titular de la autorización de comercialización:** Ecuphar veterinaria S.L.U. Avda. Río de Janeiro, 60-66, Planta 13. 08016 Barcelona. **Número de la autorización:** 2156 ESP.