

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI

Próbna Matura z OPERONEM

Chemia

Poziom rozszerzony


Listopad 2013

W niniejszym schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe poprawne odpowiedzi. W tego typu zadaniach należy również uznać odpowiedzi ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich sens jest zgodny z podanym schematem, oraz inne poprawne odpowiedzi w nim nieprzewidziane.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów													
1.	Poprawna odpowiedź: Symbol pierwiastka X: Ca Liczba atomowa pierwiastka X: 20	1													
	1 pkt – poprawne podanie symbolu oraz liczby atomowej pierwiastka 0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi														
2.	Poprawna odpowiedź: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$	1													
	1 pkt – poprawne podanie konfiguracji elektronowej 0 pkt – niepoprawne podanie konfiguracji elektronowej lub brak odpowiedzi														
3.	Poprawna odpowiedź:	1													
	<table><tr><th>Liczba kwantowa</th><th>Elektron 1</th><th>Elektron 2</th></tr><tr><td>n</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>l</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>m</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>m_s</td><td>$+\frac{1}{2}$</td><td>$-\frac{1}{2}$</td></tr></table>		Liczba kwantowa	Elektron 1	Elektron 2	n	4	4	l	0	0	m	0	0	m_s
Liczba kwantowa	Elektron 1	Elektron 2													
n	4	4													
l	0	0													
m	0	0													
m_s	$+\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$													
	1 pkt – poprawne podanie stanu dwóch elektronów walencyjnych 0 pkt – poprawne podanie stanu jednego elektronu walencyjnego, niepoprawne podanie stanu dwóch elektronów walencyjnych lub brak odpowiedzi														
4.	Poprawna odpowiedź: 82	1													
	1 pkt – poprawne podanie liczby atomowej pierwiastka 0 pkt – niepoprawne podanie liczby atomowej pierwiastka lub brak odpowiedzi														

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów										
5.	Przykład poprawnej odpowiedzi: <table><tr><th>Czas [lata]</th><th>Pozostała masa [g]</th></tr><tr><td>1620</td><td>$1 - 0,5 \cdot 1 = 0,5$</td></tr><tr><td>3240</td><td>$0,5 - 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$</td></tr><tr><td>4860</td><td>$0,25 - 0,5 \cdot 0,25 = 0,125$</td></tr><tr><td>6480</td><td>$0,125 - 0,5 \cdot 0,125 = 0,0625$</td></tr></table> Odpowiedź: Z próbki o masie 1 g tego izotopu pozostanie 0,0625 g po 6480 latach. 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń, podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów rachunkowych, prowadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką, lub brak wyniku 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak obliczeń	Czas [lata]	Pozostała masa [g]	1620	$1 - 0,5 \cdot 1 = 0,5$	3240	$0,5 - 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$	4860	$0,25 - 0,5 \cdot 0,25 = 0,125$	6480	$0,125 - 0,5 \cdot 0,125 = 0,0625$	2
Czas [lata]	Pozostała masa [g]											
1620	$1 - 0,5 \cdot 1 = 0,5$											
3240	$0,5 - 0,5 \cdot 0,5 = 0,25$											
4860	$0,25 - 0,5 \cdot 0,25 = 0,125$											
6480	$0,125 - 0,5 \cdot 0,125 = 0,0625$											
6.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $\frac{v_2}{v_1} = \frac{k \cdot \left[\frac{1}{2}N_2\right] \cdot [3H_2]^3}{k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3} = \frac{k \cdot \frac{1}{2} \cdot [N_2] \cdot 27 \cdot [H_2]^3}{k \cdot [N_2] \cdot [H_2]^3} = 13,5$ Odpowiedź: Szybkość reakcji wzrośnie 13,5 raza. 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie poprawnego wyniku 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń i popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak odpowiedzi	2										
7.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $ZnS + 2 HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2S$ $Zn(NO_3)_2 + 2 NaOH \longrightarrow Zn(OH)_2 + 2 NaNO_3$ $Zn(OH)_2 + 2 NaOH \longrightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$ 3 pkt – poprawne zapisanie trzech równań reakcji 2 pkt – poprawne zapisanie dwóch równań reakcji 1 pkt – poprawne zapisanie jednego równania reakcji 0 pkt – brak poprawnie zapisanych równań reakcji lub brak odpowiedzi	3										
8.	Poprawna odpowiedź: Probówka I: zasadowy Probówka II: obojętny Probówka III: kwasowy 1 pkt – poprawne podanie odczynu w trzech probówkach 0 pkt – poprawne podanie odczynu w dwóch lub w jednej probówce, brak poprawnie podanego odczynu lub brak odpowiedzi	1										
9.	Poprawna odpowiedź: Probówka I: $CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ Probówka II: hydroliza nie zachodzi Probówka III: $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$ 1 pkt – poprawne zapisanie dwóch równań reakcji oraz zaznaczenie, że reakcja nie zachodzi dla jednej probówki 0 pkt – brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1										

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
10.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $\text{MnO}_4^- + \text{NO}_2^- + \text{OH}^- \longrightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ $2 \text{MnO}_4^- + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{MnO}_4^{2-}$ $\text{NO}_2^- + 2 \text{OH}^- \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e}^-$ $2 \text{MnO}_4^- + \text{NO}_2^- + 2 \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{MnO}_4^{2-} + \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$ 3 pkt – poprawne zapisanie dwóch równań połówkowych oraz poprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej 2 pkt – poprawne zapisanie dwóch równań połówkowych oraz niepoprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej 1 pkt – poprawne zapisanie jednego z dwóch równań połówkowych oraz niepoprawne zapisanie zbilansowanego równania reakcji w formie skróconej jonowej 0 pkt – niepoprawne zapisanie dwóch równań połówkowych lub brak odpowiedzi	3
11.	Poprawna odpowiedź: Utleniacz: MnO_4^- Reduktor: NO_2^- 1 pkt – poprawne wskazanie utleniacza i reduktora 0 pkt – niepoprawne wskazanie utleniacza lub reduktora, lub brak odpowiedzi	1
12.	Poprawna odpowiedź: $\text{K}(-) 4 \text{Ag}^+ + 4 \text{e}^- \longrightarrow 4 \text{Ag}$ $\text{A}(+) 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$ 1 pkt – poprawne zapisanie dwóch równań reakcji elektrodowych 0 pkt – poprawne zapisanie jednego z równań reakcji elektrodowych, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1
13.	Przykład poprawnej odpowiedzi: W warunkach normalnych w $22,4 \text{ dm}^3 \text{ O}_2$ znajdują się 32 g tego gazu. Stąd w 56 cm^3 znajduje się 0,08 g. Reakcja zachodząca na anodzie: $2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}^-$ Z równania reakcji wynika, że w reakcji biorą udział 4 mole elektronów, stąd ładunek q, który przepłynął przez elektrodę, jest równy 386000 C. Obliczenie wartości ładunku potrzebnego do otrzymania 0,08 g tlenu: 32 g tlenu – 386000 C 0,08 g tlenu – $x \Rightarrow x = 965 \text{ C}$ Obliczenie wartości natężenia prądu: $q = I \cdot t \Rightarrow I = \frac{q}{t} = \frac{965}{300} = 3,22 \text{ A} \left[\frac{\text{C}}{\text{s}} = \text{A} \right]$ Odpowiedź: Natężenie prądu powinno być równe 3,22 A. 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń, podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów rachunkowych, prowadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką, lub brak wyniku 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak obliczeń	2



Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
14.	Przykład poprawnej odpowiedzi: Schemat doświadczenia: stężony kwas azotowy(V), stężony kwas siarkowy(VI)  Odczynniki: stężone roztwory kwasu azotowego(V) i kwasu siarkowego(VI) Obserwacje: probówka z benzenem – zaobserwowano żółte zabarwienie roztworu i pojawienie się zapachu gorzkich migdałów; probówka z cykloheksanem – nie zaobserwowano zmian Wnioski: W pierwszej probówce znajdował się benzen, w drugiej cykloheksan. 3 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zaproponowanie odczynnika identyfikacyjnego oraz poprawne zapisanie obserwacji i wniosków 2 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zaproponowanie odczynnika identyfikacyjnego oraz poprawne zapisanie obserwacji i niepoprawne zapisanie wniosków 1 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, niepoprawne zaproponowanie odczynnika identyfikacyjnego oraz niepoprawne zapisanie obserwacji i wniosków 0 pkt – niepoprawne narysowanie schematu doświadczenia lub brak odpowiedzi	3
15.	Przykład poprawnej odpowiedzi: <O=C=O>  $[\text{Cl}]^- \text{Ca}^{2+} [\text{Cl}]^-$ 3 pkt – poprawne narysowanie trzech wzorów 2 pkt – poprawne narysowanie dwóch wzorów 2 pkt – poprawne narysowanie jednego wzoru 0 pkt – brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	3

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
16.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $C_m = \frac{n}{V_r} \Rightarrow n = C_m \cdot V_r = 0,75 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,15 \text{ dm}^3 = 0,1125 \text{ mola}$ $M_{\text{HNO}_3} = 63,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ $n = \frac{m_s}{M} \Rightarrow m_s = n \cdot M = 0,1125 \text{ mola} \cdot 63,01 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 7,09 \text{ g}$ $C_p = \frac{m_s}{m_r} \cdot 100\% \Rightarrow m_r = \frac{m_s \cdot 100\%}{C_p} = \frac{7,09 \text{ g} \cdot 100\%}{65\%} = 10,91 \text{ g}$ $d_r = \frac{m_r}{V_r} \Rightarrow V_r = \frac{m_r}{d_r} = \frac{10,91 \text{ g}}{1,40 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}} = 7,79 \text{ cm}^3$ Odpowiedź: Należy odmierzyć 7,79 cm³ roztworu kwasu azotowego(V). 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń, podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów rachunkowych, prowadzących do błędnego wyniku lub podanie wyniku z błędną jednostką lub brak wyniku 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak obliczeń	2
17.	Poprawna odpowiedź: $\text{Cu}^{2+} + \text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$ 1 pkt – poprawne zapisanie reakcji 0 pkt – niepoprawne zapisanie reakcji lub brak odpowiedzi	1
18.	Poprawna odpowiedź: $(-) \text{Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+} \mid \text{Cu} (+)$ 1 pkt – poprawne zapisanie schematu ogniwa 0 pkt – niepoprawne zapisanie schematu ogniwa lub brak odpowiedzi	1
19.	Poprawna odpowiedź: $\text{SEM} = E_k - E_a = 0,34 \text{ V} - (-0,76 \text{ V}) = 1,1 \text{ V}$ Odpowiedź: Siła elektromotoryczna ogniwa wynosi 1,1 V. 1 pkt – poprawne obliczenie SEM 0 pkt – niepoprawne obliczenie SEM lub brak odpowiedzi	1
20.	Poprawna odpowiedź: Zlewka 1: niebieski Zlewka 2: czerwony 1 pkt – poprawne podanie koloru uniwersalnego papierka wskaźnikowego w dwóch zlewkach 0 pkt – poprawne podanie koloru uniwersalnego papierka wskaźnikowego w jednej zlewce, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
21.	Przykład poprawnej odpowiedzi: Zlewka 1: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ $n_{\text{NH}_3} = c_{\text{NH}_3} \cdot V_{\text{NH}_3} = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,05 \text{ dm}^3 = 0,0125 \text{ mola NH}_3$ $c_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{V_r} = \frac{0,0125 \text{ mola}}{0,25 \text{ dm}^3} = 0,05 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ $\frac{c_{\text{NH}_3}}{K_{\text{bNH}_3}} = \frac{0,05 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}}{1,75 \cdot 10^{-5}} = 2857 > 400$ $\alpha = \sqrt{\frac{K_{\text{bNH}_3}}{c_{\text{NH}_3}}} = \sqrt{\frac{1,75 \cdot 10^{-5}}{0,05}} = \sqrt{3,5 \cdot 10^{-4}} = 1,87 \cdot 10^{-2}$ $[\text{OH}^-] = \alpha \cdot c_{\text{NH}_3} = 1,87 \cdot 10^{-2} \cdot 0,05 = 9,35 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ Zlewka 2: $\text{NH}_3 + \text{HNO}_3 \longrightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3$ $n_{\text{NH}_3} = c_{\text{NH}_3} \cdot V_{\text{NH}_3} = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,05 \text{ dm}^3 = 0,0125 \text{ mola NH}_3$ $n_{\text{HNO}_3} = c_{\text{HNO}_3} \cdot V_{\text{HNO}_3} = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,2 \text{ dm}^3 = 0,05 \text{ mola HNO}_3$ Po reakcji: $n_{\text{NH}_3} = 0$ $n_{\text{HNO}_3} = 0,05 - 0,0125 = 0,0375 \text{ mola}$ $c_{\text{HNO}_3} = \frac{n_{\text{HNO}_3}}{V_r} = \frac{0,0375 \text{ mola}}{0,25 \text{ dm}^3} = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ $[\text{H}^+] = c_{\text{HNO}_3} = 0,15 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ $[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}^+]} = 6,67 \cdot 10^{-14} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ Odpowiedź: Stężenie jonów hydroksylowych z zlewce 1 wynosi $9,35 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. lub: Stężenie jonów hydroksylowych z zlewce 2 wynosi $6,67 \cdot 10^{-14} \text{ mol/dm}^3$. 2 pkt – poprawne obliczenie stężenia jonów hydroksylowych w dwóch roztworach 1 pkt – poprawne obliczenie stężenia jonów hydroksylowych w jednym roztworze 0 pkt – brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	2
22.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $S_{\text{PbSO}_4} = \sqrt{I_r} = 1,05 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ $S_{\text{PbCrO}_4} = \sqrt{I_r} = 1,34 \cdot 10^{-7} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$ Odpowiedź: Siarczan(VI) ołowiu(II) ma wyższą rozpuszczalność, jest zatem lepiej rozpuszczalny. Możliwe jest przeprowadzenie soli trudno rozpuszczalnych w trudniej rozpuszczalne, zatem przedstawiona reakcja zajdzie w prawo. 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń, podanie poprawnej odpowiedzi 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak obliczeń	1

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
23.	Poprawna odpowiedź: I. $\text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HS}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ II. $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{S}^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$ 1 pkt – poprawne podanie dwóch reakcji dysocjacji 0 pkt – poprawne podanie jednej reakcji dysocjacji, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1
24.	Poprawna odpowiedź: $K_{a_1} = \frac{[\text{HS}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{S}]}$ $K_{a_2} = \frac{[\text{S}^{2-}] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HS}^-]}$ 1 pkt – poprawne podanie dwóch wyrażeń na stałe dysocjacji 0 pkt – poprawne podanie jednego wyrażenia na stałą dysocjacji, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1
25.	Poprawna odpowiedź: $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{HS}^-] > [\text{S}^{2-}]$ 1 pkt – poprawne uszeregowanie 0 pkt – niepoprawne uszeregowanie lub brak odpowiedzi	1
26.	Poprawna odpowiedź: a) w prawo b) w lewo c) w lewo d) nie wpłynie 2 pkt – poprawna odpowiedź w czterech podpunktach 1 pkt – poprawna odpowiedź w trzech podpunktach 0 pkt – poprawna odpowiedź w dwóch lub jednym podpunkcie, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	2
27.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $pV = nRT \Rightarrow n = \frac{pV}{RT} = \frac{1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 293 \text{ K}} = 0,21 \text{ mola}$ 328 g $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ – 4 mole NO_2 x – 0,21 mola $\text{NO}_2 \Rightarrow x = 17,22 \text{ g Ca}(\text{NO}_3)_2$ Odpowiedź: Należy odważyć 17,22 g azotanu(V) wapnia. 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, poprawne wykonanie obliczeń, podanie poprawnego wyniku z błędną jednostką lub bez jednostki 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń lub brak obliczeń	2
28.	Przykład poprawnej odpowiedzi: $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$ Nazwa systematyczna: 2,2,4-trimetyloheksan 1 pkt – poprawne narysowanie związku oraz poprawne podanie nazwy systematycznej 0 pkt – poprawne narysowanie związku, ale niepoprawne podanie nazwy systematycznej, niepoprawne narysowanie związku lub brak odpowiedzi	1

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
29.	$\text{C}_3\text{H}_{4(\text{g})} + 4 \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow 3 \text{CO}_{2(\text{g})} + 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ $\text{C}_3\text{H}_{4(\text{g})} \longrightarrow 3 \text{C}_{(\text{s})} + 2 \text{H}_{2(\text{g})} \quad -\Delta H_1^0$ $3 \text{CO}_{(\text{g})} + \frac{3}{2} \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow 3 \text{CO}_{2(\text{g})} \quad 3 \cdot \Delta H_3^0$ $3 \text{C}_{(\text{s})} + \frac{3}{2} \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow 3 \text{CO}_{(\text{g})} \quad 3 \cdot \Delta H_2^0$ $2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{c})} \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{g})} \quad 2 \cdot \Delta H_5^0$ $2 \text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}_{(\text{c})} \quad 2 \cdot \Delta H_4^0$ $\Delta H^0 = -\Delta H_1^0 + 3 \cdot \Delta H_3^0 + 3 \cdot \Delta H_2^0 + 2 \cdot \Delta H_5^0 + 2 \cdot \Delta H_4^0 = -1945,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$ Odpowiedź: Entalpia reakcji całkowitego spalania propynu wynosi $-1945,8 \text{ kJ/mol}$. 2 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, wykonanie poprawnych obliczeń i podanie poprawnego wyniku wraz z jednostką 1 pkt – zastosowanie poprawnej metody obliczeń, ale popełnienie błędów rachunkowych, podanie błędnego wyniku lub brak wyniku 0 pkt – zastosowanie niepoprawnej metody obliczeń, błędne wykonanie obliczeń lub brak obliczeń	2
30.	Poprawna odpowiedź: Wewnątrz miceli 1 znajduje się cząstka polarna. Wewnątrz miceli 2 znajduje się cząstka niepolarna. 1 pkt – poprawne uzupełnienie dwóch zdań 0 pkt – poprawne uzupełnienie jednego zdania, brak poprawnej odpowiedzi lub brak odpowiedzi	1
31.	Przykład poprawnej odpowiedzi: Mleko zabarwia się na kolor żółty. 1 pkt – poprawne podanie obserwacji 0 pkt – niepoprawna odpowiedź lub brak odpowiedzi	1

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
32.	Przykład poprawnej odpowiedzi: Doświadczenie:  Obserwacje: wytrącił się ceglastoczerwony osad Równanie reakcji: $ \begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{HC}=\text{CH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} + 2 \text{Cu(OH)}_2 \xrightarrow{T} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{C}=\text{O} \\ \\ \text{HC}=\text{CH} \\ \\ \text{C}_6\text{H}_5 \end{array} + \text{Cu}_2\text{O} + 2 \text{H}_2\text{O} $ 3 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zapisanie obserwacji oraz poprawne zapisanie równania reakcji chemicznej 2 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zapisanie obserwacji oraz niepoprawne zapisanie równania reakcji chemicznej 1 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, niepoprawne zapisanie obserwacji oraz niepoprawne zapisanie równania reakcji chemicznej 0 pkt – niepoprawne narysowanie schematu doświadczenia lub brak odpowiedzi	3
33.	Przykład poprawnej odpowiedzi: Doświadczenie:  Obserwacje: roztwór zabarwił się na czerwono Wnioski: woda nasycona tlenkiem węgla(IV) wykazuje odczyn kwasowy 3 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zapisanie obserwacji oraz poprawne zapisanie wniosków 2 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, poprawne zapisanie obserwacji oraz niepoprawne zapisanie wniosków 1 pkt – poprawne narysowanie schematu doświadczenia, niepoprawne zapisanie obserwacji oraz niepoprawne zapisanie wniosków 0 pkt – niepoprawne narysowanie schematu doświadczenia lub brak odpowiedzi	3

Numer zadania	Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów	Liczba punktów
34.	Poprawna odpowiedź: $\begin{array}{c} \text{O} \quad \text{NH}_2 \\ \parallel \quad / \\ \text{C} - \text{CH} \\ / \quad \backslash \\ \text{O}^- \quad \text{CH}_3 \end{array}$ 1 pkt – poprawne narysowanie wzoru 0 pkt – niepoprawne narysowanie wzoru lub brak odpowiedzi	1
35.	Poprawna odpowiedź: a) $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array} + \text{CH}_3\text{COOH} \xrightleftharpoons{\text{H}_2\text{SO}_4} \begin{array}{c} \text{O} - \text{CO} - \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ b) $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array} + \text{CH}_3\text{OH} \xrightleftharpoons{\text{H}_2\text{SO}_4} \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOCH}_3 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ c) $\begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array} + \text{NaOH} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COONa} \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ 3 pkt – poprawne zapisanie równań reakcji w trzech przypadkach 2 pkt – poprawne zapisanie równań reakcji w dwóch przypadkach 1 pkt – poprawne zapisanie równań reakcji w jednym przypadku 0 pkt – niepoprawne zapisanie równań reakcji trzech przypadkach lub brak odpowiedzi	3
36.	Poprawna odpowiedź: Wzór aldehydu: $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CHO} \end{array}$ Reakcja 1: $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CHO} \end{array} + \text{H}_2 \xrightarrow{\text{Pt}} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2\text{OH} \end{array}$ Reakcja 2: $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2\text{OH} \end{array} \xrightarrow{\text{Al}_2\text{O}_3} \begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} = \text{CH}_2 \end{array} + \text{H}_2\text{O}$ 3 pkt – poprawne podanie wzoru związku oraz poprawne zapisanie dwóch równań reakcji 2 pkt – poprawne podanie wzoru związku oraz poprawne zapisanie jednego równania reakcji 1 pkt – poprawne podanie wzoru związku oraz niepoprawne zapisanie równań reakcji w dwóch przypadkach 0 pkt – niepoprawne podanie wzoru związku lub brak odpowiedzi	3