

FICHA TÉCNICA



XTRAQUEL®
FIERRO

NOMBRE COMERCIAL:

INGREDIENTE ACTIVO:

FIERRO +L-AMINOÁCIDOS
+ ÁCIDOS FÚLVICOS

CLAVE:

NVQ-CL-02

REGIÓN:

MX.

REGISTRO:

COFEPRIS-06-022-X
(163300622X0423)

DESCRIPCIÓN:

FERTILIZANTE QUELATADO A BASE DE FIERRO Y AMINOÁCIDOS

XTRAQUEL FIERRO

Es un fertilizante foliar con un alto contenido de hierro quelatado en un compuesto orgánico estable. Permite una recuperación inmediata de la deficiencia por este micronutriente en los cultivos más susceptibles.

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

<i>DETERMINACIÓN</i>	<i>RESULTADO</i>
Fierro (Fe)	5.00%
Aminoácidos totales	2.00%
Ácidos fúlvicos	2.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

<i>¿CÓMO ES?</i>	
Color	Café oscuro
Apariencia	Líquido
Solubilidad	100%
pH	3.54
Densidad	1.20

MECANISMO DE ACCIÓN Y RECOMENDACIONES:

GENERALIDADES DEL MECANISMO DE ACCIÓN.

Es una fuente de hierro quelatada para aplicación foliar y al suelo, complementada con L- aminoácidos libres y extractos orgánicos. La formulación de **Xtraquel Fierro** permite integrar este importante micro elemento en la activación metabólica de la planta.

RECOMENDACIONES DE USO

Utilícese en las fases de mayor crecimiento, y también en viveros y plantaciones jóvenes, y en cultivos afectados o en defectuoso estado vegetativo, fitotoxicidades, plagas o enfermedades, sequía, etc.

DOSIS DE APLICACIÓN:

CULTIVO	¿CUÁNDO APLICAR?	DOSIS L/Ha
Algodón	En plantas de 10 a 15 días de emergidas y repetir cada 15 días, según la necesidad del cultivo.	2 a 3
Cereales y granos	Al crecimiento vegetativo, repetir en amacollamiento y en grano lechoso.	2 a 3
Fresa	15 días después del trasplante, al inicio de la floración, al inicio de desarrollo del fruto y repetir cada 15 días según se requiera.	3 a 4
Frutales caducifolios y perennifolios	Al crecimiento de brotes, al inicio de floración y en crecimiento de frutos.	4 a 5
Hortalizas en general	Al crecimiento vegetativo, repetir en floración y en crecimiento de frutos.	2 a 3
Leguminosas	En plantas de 15 a 20 días de emergidas, repetir en botón floral, en crecimiento de vainas.	2 a 3
Maiz y sorgo	Cuando las plantas tengan entre 30 y 50 cm de altura y repítalas dosis antes de espigar.	2 a 3