Math & Manips
pour le secondaire supérieur

Problèmes d'optimisation

Activités

- Boîte sans couvercle
- Boîte parallélépipédique
- Cube
- Cône (pour sections scientifiques)

Découper un carré dans chacun des coins d'une feuille A4 pour construire une boîte parallélépipédique sans couvercle et en calculer le volume.

Construire par ce procédé la boîte dont le volume est maximal.


29,7
x
21



côté en cm			volume en cm^3 V
x			
1			526,3
2			873,8
3			1066,5
4			1128,4
5			1083,5
6			955,8
7			769,3
8			548
9			315,9
10			97



hauteur en cm h	largeur en cm ℓ	longueur en cm L	volume en cm^3 V
x			
1	19	27,7	526,3
2	17	25,7	873,8
3	15	23,7	1066,5
4	13	21,7	1128,4
5	11	19,7	1083,5
6	9	17,7	955,8
7	7	15,7	769,3
8	5	13,7	548
9	3	11,7	315,9
10	1	9,7	97



hauteur en cm h	largeur en cm ℓ	longueur en cm L	volume en cm^3 V
x	$21-2x$	$29{,}7-2x$	$x(21-2x)(29{,}7-2x)$
1	19	27,7	526,3
2	17	25,7	873,8
3	15	23,7	1066,5
4	13	21,7	1128,4
5	11	19,7	1083,5
6	9	17,7	955,8
7	7	15,7	769,3
8	5	13,7	548
9	3	11,7	315,9
10	1	9,7	97

$$V(x) = x(21-2x)(29{,}7-2x)$$



hauteur en cm h	largeur en cm ℓ	longueur en cm L	volume en cm^3 V
x	$21-2x$	$29{,}7-2x$	$x(21-2x)(29{,}7-2x)$
1	19	27,7	526,3
2	17	25,7	873,8
3	15	23,7	1066,5
4	13	21,7	1128,4
5	11	19,7	1083,5
6	9	17,7	955,8
7	7	15,7	769,3
8	5	13,7	548
9	3	11,7	315,9
10	1	9,7	97

$$V(x) = x(21-2x)(29{,}7-2x)$$

$x = 4$ cm réalise-t-il le maximum ?



Avec le logiciel GeoGebra

$$V(x) = x(21 - 2x)(29{,}7 - 2x)$$

$$V(x) = 4\ x^3 - 101{,}4\ x^2 + 623{,}7\ x$$

$$V'(x) = 12\ x^2 - 202{,}8\ x + 623{,}7$$

$V'(x) = 0$ en $x = 4{,}04$ ou $x = 12{,}73$

$$V(x) = x(21 - 2x)(29{,}7 - 2x)$$

$$V(x) = 4\ x^3 - 101{,}4\ x^2 + 623{,}7\ x$$

$$V'(x) = 12\ x^2 - 202{,}8\ x + 623{,}7$$

$V'(x) = 0$ en $x = 4{,}04$ ou $x = 12{,}73$

$x = 4{,}04$ solution admissible de l'équation $V'(x) = 0$ est ici validée par le travail sur le graphique.

En découpant symétriquement un rectangle de chaque côté d'une feuille carrée de 20 cm de côté, de façon à obtenir un T, on peut obtenir le développement d'une boîte parallélépipédique fermée.

Construire la boîte dont le volume est le plus grand possible.





Une boîte à base carrée est constructible, en existe-t-il d'autres ?









$$V = x \cdot \ell \cdot L$$

$$\begin{cases} 2x + 2\ell &= 20 \\ 2x + L &= 20 \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} \ell &= 10 - x \\ L &= 20 - 2x \end{cases}$$

$$V(x) = x(10 - x)(20 - 2x)$$

$$y = 20 - \ell = 10 + x$$

$$V(x) = x(10 - x)(20 - 2x)$$



$$V(x) = 2x^3 - 40x^2 + 200x$$

$$V'(x) = 6x^2 - 80x + 200$$

$$V'(x) = 0$$

en $x = \frac{10}{3}$ ou $x = 10$

$$x_{opt} = \frac{10}{3}$$

et $y_{opt} = \frac{40}{3}$ en découle.

Construire dans cette feuille A4 le développement d'un cube de volume maximal.

Les découpes seront parallèles aux bords de la feuille, le développement doit être d'un seul tenant et les faces du cube entières.





Choix de la variable :
x longueur de l'arête du cube.

$$V(x) = x^3$$

$$\begin{cases} 3x & \leq & 21 \\ 4x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$$x_{opt} = 7 \text{ cm}$$

Choix de la variable :
x longueur de l'arête du cube.

$$V(x) = x^3$$

$$\begin{cases} 3x & \leq & 21 \\ 4x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$$x_{opt} = 7 \text{ cm}$$

Refaire le même exercice à partir d'une feuille A4 coupée en deux dans le sens de la longueur.

Premier système de contraintes

$$\begin{cases} 3x & \leq & 10{,}5 \\ 4x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$x_{opt} = 3{,}5$ cm

Premier système de contraintes

$$\begin{cases} 3x & \leq & 10{,}5 \\ 4x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$x_{opt} = 3{,}5$ cm



Premier système de contraintes

$$\begin{cases} 3x & \leq & 10{,}5 \\ 4x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$x_{opt} = 3{,}5$ cm



Autre système de contraintes

$$\begin{cases} 2x & \leq & 10{,}5 \\ 5x & \leq & 29{,}7 \end{cases}$$

$x_{opt} = 5{,}25$ cm



Déterminer l'arête du cube de volume maximal dont un développement est découpé parallèlement aux bords dans une feuille de largeur ℓ et de longueur L.

Déterminer l'arête du cube de volume maximal dont un développement est découpé parallèlement aux bords dans une feuille de largeur ℓ et de longueur L.

Développement 3x4

$$\begin{cases} 3x & \leq & \ell \\ 4x & \leq & L \end{cases}$$

$$x_{34} = \min\left\{\frac{\ell}{3}, \frac{L}{4}\right\}$$

Développement 2x5

$$\begin{cases} 2x & \leq & \ell \\ 5x & \leq & L \end{cases}$$

$$x_{25} = \min\left\{\frac{\ell}{2}, \frac{L}{5}\right\}$$

$$x_{opt} = \max\left\{x_{34}, x_{25}\right\}$$

En découpant un secteur d'un disque de 10 cm de rayon, construire un cône dont le volume est le plus grand possible.


170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70


10 cm
h
r
10 cm
α



$$V(h,r) = \frac{\pi}{3} r^2 h$$

$$\begin{cases} h^2 + r^2 = 10^2 \\ (2\pi - \alpha)10 = 2\pi r \end{cases}$$

Les valeurs admissibles pour r et h sont comprises entre 0 et 10 ; celles pour α, en radians, sont comprises entre 0 et 2π.

$$\begin{cases} r = \sqrt{100 - h^2} \\ \alpha = 2\pi\frac{10-r}{10} \end{cases} \Rightarrow V(h) = \frac{\pi}{3}(100h - h^3)$$

$$\begin{cases} h = \sqrt{100 - r^2} \\ \alpha = 2\pi\frac{10-r}{10} \end{cases} \Rightarrow V(r) = \frac{\pi}{3}r^2\sqrt{100 - r^2}$$

$$\begin{cases} r = 10\frac{2\pi-\alpha}{2\pi} \\ h = \sqrt{100 - r^2} \end{cases} \Rightarrow V(\alpha) = \frac{125}{3\pi^2}(2\pi - \alpha)^2\sqrt{4\pi\alpha - \alpha^2}$$

$$V(h) = \frac{\pi}{3}(100h - h^3)$$

$$V'(h) = \frac{\pi}{3}(100 - 3h^2)$$
$$V'(h) = 0 \Leftrightarrow h = -\frac{\sqrt{3}}{3}10 \text{ ou } h = \frac{\sqrt{3}}{3}10$$
$$h_{opt} = \frac{\sqrt{3}}{3}10 \approx 5{,}77 \text{ cm}$$

$$r = \sqrt{100 - h^2} \Rightarrow r_{opt} = \sqrt{100 - \left(\frac{\sqrt{3}}{3}10\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}10$$
$$r_{opt} \approx 8,165 \text{ cm}$$

$$\alpha = 2\pi\frac{10-r}{10} \Rightarrow \alpha_{opt} = 2\pi\left(1 - \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$
$$\alpha_{opt} \approx 1{,}15 \text{ rad ou } \approx 66°$$

- p périmètre de la base du cône

$$\begin{cases} r = \frac{p}{2\pi} \\ h = \sqrt{100 - r^2} \\ \alpha = 2\pi\frac{10-r}{10} \end{cases} \Rightarrow V(p) = \frac{p^2}{24\pi^2}\sqrt{400\pi^2 - p^2}$$

- x angle du secteur conservé

$$\begin{cases} \alpha = 2\pi - x \\ r = \frac{10x}{2\pi} \\ h = \sqrt{100 - r^2} \end{cases} \Rightarrow V(x) = \frac{125}{6\pi^2}x^2\sqrt{4\pi^2 - x^2}$$

- Maximiser le carré du volume
  (avec changement d'unité : dm au lieu de cm)

$$V^2(\alpha) = \frac{1}{576\pi^4}(2\pi - \alpha)^4(4\pi\alpha - \alpha^2)$$

Objectifs

- Boîte sans couvercle
  nature de l'optimisation, modélisation, variable et valeurs admissibles, tableau de valeurs, graphique, fonction, dérivée
- Boîte parallélépipédique
  contraintes, variables liées et variable indépendante
- Cube
  limite de l'outil dérivée, preuve
- Cône (pour sections scientifiques)
  choix de la variable indépendante

Réflexions sur les problèmes d'optimisation

- Importance du contexte
- Importance de la formulation de la question
- Difficulté de la modélisation
- Outil dérivée : condition nécessaire et suffisante
- Comment peut-on s'assurer que l'on a l'extremum demandé ?

Compétences transversales

- S'approprier une situation.
- Formuler une conjecture, dégager une méthode de travail.
- Traduire une information d'un langage dans un autre, du langage graphique au langage algébrique et réciproquement.

Compétences disciplinaires

- Modéliser des problèmes de manière à les traiter au moyen des fonctions de références ...
- Esquisser, construire un graphique pour mettre en évidence des caractéristiques du phénomène traité, interpréter un graphique en le reliant au problème qu'il modélise.

Références

- APMEP, 2003. *Projet de création d'un laboratoire de mathématiques. Lycée Mas de Tesse.*
- Bkouche, Charlot, Rouche, 1991. *Faire des mathématiques : le plaisir du sens*.
- Bkouche, 2008. Du caractère expérimental des mathématiques - À propos des laboratoires de mathématiques, *Repères-IREM*, 70.
- Borel, 1904. *Les exercices pratiques de mathématiques dans l'enseignement secondaire.*
- Caron-Pargue, 1981. Quelques aspects de la manipulation, *RDM*, 2.1.
- Dias, Durand-Guerrier, 2005. Expérimenter pour apprendre en mathématiques, *Repères-IREM*, 60.
- Dias, 2009. La dimension expérimentale en mathématiques, *Grand N*, 83.
- Guissard, Henry, Agie, Lambrecht, 2010. Math & Manips, *Losanges*, 7.
- Henry, Lambrecht, 2012. Compétences en Communauté française de Belgique : illustration via l'introduction de manipulations en classe, *Repères-IREM*, 88.
- Ministère de la Communauté française, 1999. *Compétences terminales et savoirs requis en mathématiques.*

Merci pour votre attention
et votre participation, des questions ?

$\sim\sim\sim$

e-mail : info@crem.be

site web : www.crem.be