

السؤال 1 من بروت الفيزياء — كهرباء ومغناطيسية — بروت 1992


(هنا نحلّ هذا السؤال كاملاً.)

نص السؤال

شحنة نقطية موجبة موجودة في النقطة O. نحيطها بغلاف كروي موصل سميك غير مشحون، مركزه في النقطة O. النقطة A خارج الغلاف، والنقطة B داخل التجويف.

المعطيات:

- الشحنة النقطية $+q$ في المركز O.
- نصف القطر الداخلي للغلاف R_1 ، ونصف القطر الخارجي R_2 .
- بعد النقطة A عن المركز r_A ، وهي خارج الغلاف.
- بعد النقطة B عن المركز r_B ، وهي داخل التجويف.



- أ. المطلوب: هل يتغير بسبب إضافة الغلاف (1) الحقل الكهربائي في النقطة A؟ (2) الجهد الكهربائي في النقطة A؟ إذا لا، نشرح لماذا. إذا نعم، نجد تعبيراً للتغير بدلالة q, r_A, R_1, R_2 .
- ب. المطلوب: نفس أسئلة البند أ للنقطة B، والتعبير بدلالة q, r_B, R_1, R_2 .
- ج. المطلوب: نؤرّض الغلاف (نوصله بالأرض). هل يؤثر ذلك على الحقل في النقطة A؟ نعلّل.


الحل: أ(1). لا يتغير أ(2). لا يتغير ب (الحقل). لا يتغير ب (الجهود). يقل: $\Delta V_B = kq \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$ ج. نعم: الحقل في A يصبح صفرًا

(صياغة السؤال والرسومات والحل: فيفو · vevo).

الحل الكامل:

البند أ

داخل مادة الموصل الحقل صفر. لذلك تتجمع على السطح الداخلي للغلاف شحنة مستحثة $-q$. الغلاف غير مشحون، فتظهر على سطحه الخارجي شحنة $+q$.



(1) نستعمل قانون غاوس على كرة نصف قطرها r_A . الشحنة المحاطة بها:

$$Q_{in} = +q - q + q = +q$$

الشحنة المحاطة لم تتغير، والتوزيع كروي متماثل. إذن الحقل في النقطة A مثل حقل شحنة نقطية q في المركز:

$$E_A = \frac{kq}{r_A^2}$$

(القانون موجود في لائحة القوانين التي تكون معك في الامتحان).

الحقل في النقطة A لا يتغير

الجواب النهائي للبند أ(1)

(2) الجهد في النقطة A هو مجموع جهود الشحنات الثلاث. الشحنة الموزعة على سطح كروي تعطي في نقطة خارجه جهدًا مثل شحنة نقطية في المركز:

$$V_A = \frac{kq}{r_A} + \frac{k(-q)}{r_A} + \frac{kq}{r_A} = \frac{kq}{r_A}$$

طريقة ثانية: الجهد هو شغل الحقل من النقطة A حتى اللانهاية، والحقل في كل هذه المنطقة لم يتغير.

الجهد في النقطة A لا يتغير

الجواب النهائي للبند أ(2)

البند ب

الحقل في النقطة B: الشحنتان على سطحي الغلاف موزعتان بانتظام على سطحين كرويين يحيطان بالنقطة B. حقل سطح كروي مشحون داخله صفر.

إذن يبقى في النقطة B حقل الشحنة q فقط:

$$E_B = \frac{kq}{r_B^2}$$

الحقل في النقطة B لا يتغير

الجواب النهائي للبند ب (الحقل)


الجهد في النقطة B: داخل سطح كروي مشحون الجهد ثابت ويساوي جهد السطح نفسه kQ/R . نجمع جهود الشحنت الثلاث:

$$V_B = \frac{kq}{r_B} + \frac{k(-q)}{R_1} + \frac{kq}{R_2}$$

قبل إضافة الغلاف كان $V_B = \frac{kq}{r_B}$. التغيير:

$$\Delta V_B = kq \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)$$

بما أن $R_2 > R_1$ ، التغيير سالب: الجهد في B يقل. السبب: في منطقة الغلاف الحقل صفر، فلا ينمو الجهد هناك عندما نقرب من المركز.




(فحصنا العلاقة بسكربت: تكامل الحقل من اللانهاية حتى النقطة B يعطي النتيجة نفسها.)

$$\Delta V_B = kq \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) < 0$$

الجواب النهائي للبند ب (الجهد): يقل

عندما نؤرض الغلاف يصبح جهده صفرًا مثل الأرض. الشحنة $+q$ على السطح الخارجي تنتقل إلى الأرض، وتبقى الشحنة $-q$ على السطح الداخلي (تجذبها الشحنة في المركز).



نطبق قانون غاوس من جديد على كرة نصف قطرها r_A :

$$Q_{in} = +q - q = 0 \Rightarrow E_A = 0$$

الغلاف المؤرض يحجب حقل الشحنة عن الخارج.

نعم: الحقل في النقطة A يصبح صفرًا

الجواب النهائي للبندج

نص الأسئلة والصور: وزارة التربية والتعليم، النموذج قديم، بجروت 1992. صياغة الأسئلة والرسومات والحلّ: فيفو · vevo. حقوق الطبع للوزارة: «النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم».

VEVO