

أسئلة الاختيار من متعدد (الفصل الأول) من بجروت عمليات بيوتكنولوجية «ب» — صيف

2015، النموذج 842201

(ملاحظة: هذا النموذج من المنهاج القديم للبيوتكنولوجيا. في المنهاج الجديد، النموذج 842387، المواضيع: الهندسة الوراثية، زراعة الخلايا، علم المناعة، مختبرات الحفز الحيوي، المعلوماتية الحيوية. هذه الأسئلة مفيدة أيضًا للمنهاج الجديد.)
(في الفصل الأول اثنا عشر سؤالاً من نوع «اختيار من متعدد»: ستة في الهندسة الوراثية، ثلاثة في التشخيص المناعي، ثلاثة في فستنبات الأنسجة. يجب الطالب عن عشرة منها فقط، ولكل سؤال 2.5 علامة، فالمجموع 25 علامة. هنا نحل الأسئلة الاثني عشر كلها.)

الحل: 1. ج 2. ب 3. د 4. د 5. أ 6. د 7. أ 8. ب 9. ج 10. ج 11. د 12. ب

(الحل والشرح: فيفو · vevo. لا تنشر وزارة التربية حلولاً لهذا الامتحان.)

الحل الكامل:

السؤال 1

السؤال 1

في أي مرحلة في طريقة التشرب الغربي يضيفون الأجسام المضادة؟


أ. قبل تحريك الزلايات بالجل

ب. قبل نقل الزلايات إلى مصفاة

ج. بعد نقل الزلايات إلى مصفاة

د. بعد تعريض فيلم التصوير إلى مصفاة

نرتب مراحل التشرب الغربي، ونرى أين يدخل الجسم المضاد:



في التشرب الغربي نصل الزلايات أولاً بالجل حسب حجمها. ثم ننقلها إلى مصفاة (غشاء). الجسم المضاد لا يستطيع أن يدخل إلى داخل الجل، لذلك نضيفه بعد النقل، عندما تكون الزلايات مكشوفة على سطح المصفاة. الجسم المضاد يرتبط فقط بالزلال الذي يحمل المُحدّد الأنّيجيني المناسب، وبعدها نكشف مكانه بالتأشير (على فيلم التصوير مثلاً).

- × أ: قبل التحريك لا توجد بعد أشرطة منفصلة، ولو ربطنا الجسم المضاد بكلّ الخليط لما عرفنا أيّ زلال هو المقصود.
- × ب: داخل الجِل لا يصل الجسم المضادّ إلى الزلاليّات بشكل جيّد، لذلك ننقلها أوّلاً إلى المصفاة.
- × د: تعريض الفيلم هو مرحلة الكشف الأخيرة، وهي تأتي بعد ارتباط الجسم المضادّ لا قبله.

ج — بعد نقل الزلاليّات إلى مصفاة

الجواب النهائي للسؤال 1


السؤال 2

السؤال 2

ما هو القول الصحيح بالنسبة لـ DNA ؟

- أ. القواعد النيتروجينية من نوع A (في إحدى الجديلتين) ترتبط بأربطة هيدروجينية مع القواعد النيتروجينية من نوع C (في الجديلة المُكمّلة لها) .
- ب. النوكليوتيدات في جديلة الـ DNA ترتبط ببعضها برابط فوسفوديستيري .
- ج. تسلسل القواعد في إحدى جديلتَي الـ DNA لا يُقرّر تسلسل القواعد في جديلة الـ DNA المُكمّلة لها .
- د. تسلسل القواعد في إحدى جديلتَي الـ DNA يُقرّر بحسب ترتيب مجموعات الفوسفات في جديلة الـ DNA المُكمّلة لها .

نمّيّز بين الرباط داخل الجديلة والرباط بين الجديلتين:



داخل **الجديلة الواحدة** ترتبط النوكليوتيدات ببعضها **برباط فوسفوديستيري** بين مجموعة الفوسفات في نوكليوتيد والسكر في النوكليوتيد التالي. هكذا ينشأ «العمود الفقري» من سكر وفوسفات. أمّا بين **الجديلتين** فتوجد **أربطة هيدروجينية** بين القواعد المُكمّلة.

× أ: القاعدة A تتزاوج مع T فقط، والقاعدة C تتزاوج مع G.

× ج: العكس هو الصحيح: تسلسل جديلة واحدة يحدّد تسلسل الجديلة المُكمّلة بدقّة، بسبب قاعدة التزاوج.

× د: مجموعات الفوسفات متشابهة في كلّ النوكليوتيدات، فلا تحمل أيّ معلومة. ما يحدّد التسلسل المُكمل هو القواعد.

ب — النوكليوتيدات في الجديلة ترتبط برابط فوسفوديستيري

الجواب النهائي للسؤال 2

السؤال 3

السؤال 3

تتطرق الأقوال التالية إلى وظائف جزيئات الـ RNA. ما هو القول الصحيح؟

- أ. RNA ناقل (tRNA) يشارك في عملية طي الزلال.
- ب. RNA ريبوزومي (rRNA) يشارك في عملية مُضاعفة الـ DNA.
- ج. RNA ناقل (tRNA) يشارك في عملية الارتباط بالـ DNA.
- د. RNA رسول (mRNA) يشارك في عملية ترجمة الزلال.

الفكرة: في الترجمة نحتاج ثلاثة أنواع من الـ RNA، ولكل نوع دور.

الـ mRNA (الرسول) ينقل المعلومة من الجين إلى الريبوسوم، ويُقرأ عليه الكودونات واحدًا بعد الآخر، أي أنه يشارك في ترجمة الزلال. الـ tRNA (الناقل) يحمل الحمض الأميني المناسب لكل كودون. الـ rRNA (الريبوزومي) جزء من مبنى الريبوسوم.

- × أ: الـ tRNA يحمل الأحماض الأمينية في الترجمة، ولا يشارك في طي الزلال بعدها.
- × ب: مضاعفة الـ DNA يقوم بها إنزيم بوليميراز الـ DNA، والـ rRNA يعمل في الريبوسوم فقط.
- × ج: الـ tRNA لا يرتبط بالـ DNA، بل يرتبط بكودون في الـ mRNA بواسطة القُضاد للكودون.

د — الـ mRNA يشارك في ترجمة الزلال

الجواب النهائي للسؤال 3

السؤال 4

السؤال 4

تتطرق الأقوال التالية إلى نشاط إنزيمات التحديد. ما هو القول الصحيح؟

- أ. إنزيمات التحديد تقطع فقط تسلسلات التحديد التي تحتوي على مجموعات مثيل.
- ب. إنزيمات التحديد تقطع فقط تسلسلات المراقبة التي تحتوي على مجموعات مثيل.
- ج. إنزيمات التحديد تُضيف مجموعات مثيل إلى تسلسلات التحديد.
- د. إنزيمات التحديد تقطع فقط تسلسلات التحديد التي لا تحتوي على مجموعات مثيل.

الفكرة: البكتيريا تحمي الـ DNA الخاص بها بإضافة مجموعات مثيل.

إنزيمات التحديد (التقييد) هي جهاز دفاع في البكتيريا ضد الفيروسات. الإنزيم يُعرّف على تسلسل معيّن ويقطعه. البكتيريا تضيف **مجموعات مثيل** إلى التسلسلات نفسها في الـ DNA الخاص بها بإنزيم آخر (ميثيلاز)، فلا يقطعها إنزيم التحديد. أمّا الـ DNA الفيروس الداخل فليس فيه مثيل، لذلك يُقطع. إذن الإنزيم يقطع فقط **تسلسلات التحديد التي لا تحتوي على مجموعات مثيل**.

× أ: العكس: المثلل يحمي التسلسل من القطع.

× ب: إنزيم التحديد لا يقطع «تسلسلات المراقبة»، بل تسلسلات تعارف خاصة به في أي مكان من الـ DNA.

× ج: إضافة المثلل يقوم بها إنزيم آخر (ميثيلاز)، لا إنزيم التحديد.

د — تقطع فقط تسلسلات التحديد التي لا تحتوي على مثيل

الجواب النهائي للسؤال 4

السؤال 5

السؤال 5

مُعطى تسلسل DNA يحتوي على مقطع معين. يريد الباحثون استنساخ هذا المقطع بمساعدة بلازميد. ما هي المرحلة الأولى في عملية الاستنساخ؟

أ. ☒ قَطْع تسلسل الـ DNA المُعطى وقَطْع بلازميد

ب. لَحْم (ligation) بلازميد مع تسلسل الـ DNA المُعطى

ج. إدخال بلازميد إلى بكتيريا

د. تعزيز تسلسل الـ DNA المُعطى بواسطة PCR

نرّب مراحل الاستنساخ في بلازميد:



الاستنساخ يبدأ بقطع الـ DNA المُعطى وقطع البلازميد بإنزيم التحديد نفسه، فنحصل على أطراف مُكَمَّلَة. بعد ذلك نلحم المقطع في البلازميد بإنزيم الليغاز، ثم ندخل البلازميد المُؤْتَلَف إلى بكتيريا، وأخيرًا ننتقي البكتيريا التي استوعبته. لا يمكن أن نلحم قبل أن نقطع، ولا أن ندخل بلازميدًا مُؤْتَلَفًا لم يُنَّ بعد.

× ب: اللحم هو المرحلة الثانية، لأنّه يحتاج أطرافًا ناتجة عن القطع.

× ج: إدخال البلازميد إلى البكتيريا هو المرحلة الثالثة، بعد بناء البلازميد المُؤْتَلَف.

× د: الـ PCR ليس جزءًا ضروريًا من الاستنساخ في بلازميد. الاستنساخ نفسه هو طريقة لإكثار المقطع داخل البكتيريا.

(ملاحظة: في المختبر الحديث قد نعرّز المقطع بالـ PCR قبل الاستنساخ، لكنّ السؤال يسأل عن المرحلة الأولى في عملية الاستنساخ بالبلازميد كما تُدرّس في المنهاج، وهي القطع.)

أ — قطع الـ DNA المُعطى وقطع البلازميد

الجواب النهائي للسؤال 5

السؤال 6

السؤال 6

أيّ قول صحيح بالنسبة للجين المُخَبِّر (Reporter gene)؟


أ. لاستنساخ جين مُخَبِّر يجب استنساخ منطقة المُراقَبة له أيضًا.

ب. الجين المُخَبِّر لا يُشَفَّر إلى زلال.

ج. الجين المُخَبِّر يُمكن من التحديد فيما إذا تَمَّت مضاعفة الجين المبحوث بصورة سليمة.

د. ☒ الجين المُخَبِّر يُمكن من التحديد فيما إذا كانت قطعة الـ DNA المجاورة له تعمل كمُنطقة مُراقَبة.

نستعمل الجين المُخبر لفحص قطعة DNA مجهولة: هل تعمل كمنطقة مراقبة؟



الجين المُخبر يشقّر زللاً يسهل رؤيته أو قياسه (مثل GFP الفلورسنتي، أو إنزيم يعطي لوناً). نربط قطعة DNA مجهولة أمام الجين المُخبر **بدل منطقة المراقبة** الخاصة به. إذا ظهرت الإشارة (لون أو إضاءة)، فهذا يعني أنّ القطعة المجاورة **تعمل كمنطقة مراقبة** (مُحفّز) وتشغّل النسخ. وإذا لم تظهر، فهي لا تعمل كمنطقة مراقبة.
× أ: في هذا الاستعمال لا نستنسخ منطقة المراقبة الخاصة بالجين المُخبر، بل نضع أمامه المنطقة التي نريد فحصها.
× ب: الجين المُخبر يشقّر زللاً، وهذا الزلال هو الذي يعطي الإشارة المرئية.
× ج: الجين المُخبر لا يفحص دقة مضاعفة الـ DNA، بل يكشف هل حدث تعبير عن جين.

د — يحدّد هل قطعة الـ DNA المجاورة تعمل كمنطقة مراقبة

الجواب النهائي للسؤال 6

السؤال 7

السؤال 7

أيّ اختبار يُستخدم للتعرف على أنتيجين مباشرةً على نسيج خلايا؟

أ. اختبار إيمونوفلوروسنتي (FIA)

ب. اختبار إشعاعي مناعي (RIA)

ج. اختبار إنزيمي مناعي (ELISA)

د. تشرب مناعي

الفكرة: على نسيج الخلايا نحتاج إشارة نراها في مكانها تحت المجهر.

في **الاختبار الإيمونوفلوروسنتي (FIA)** نضع على مقطع النسيج جسماً مضاداً مرتبطاً بمادّة **فلورسنتية**. الجسم المضاد يرتبط بالأنتيجين مباشرةً على الخلايا، ثم نرى تحت المجهر الفلورسنتي **أين** يوجد الأنتيجين في النسيج (أيّ خلايا وأي جزء من الخلية).

× ب: الاختبار الإشعاعي المناعي يقيس تركيز أنتيجين في محلول (كالدّم) بعدّاد إشعاع، لا يعطي صورة للنسيج.

× ج: الـ ELISA يقيس تركيز أنتيجين في عيّنة سائلة داخل خُفّر الصفيحة بقياس اللون.

× د: التشرب المناعي يكشف زللاً بعد استخلاصه من الخلايا وفصله في الجل، أي ليس على النسيج نفسه.

أ — اختبار إيمونوفلوروسنتي

الجواب النهائي للسؤال 7


السؤال 8

السؤال 8

أَدْخَلَ باحث في أنبوب اختبار جسمًا مضادًا ومفاعلاً يُحَلَّلُ أُرْبُطَةُ ثَنَائِيَّةِ الكبريت (S-S).
بعد ذلك حَرَّكَ الجسم المضاد بالجل. كم خطًا ظهر في الجل؟

- أ. 1
- ب. 2
- ج. 3
- د. 4

نحلل أُرْبُطَةَ S-S في الجسم المضاد، ونعدّ أنواع السلاسل التي تبقى:



الجسم المضاد مبني من **أربع سلاسل**: سلسلتان **ثقيلتان** متطابقتان، وسلسلتان **خفيفتان** متطابقتان، مرتبطة كلها بأرْبُطَةُ ثَنَائِيَّةِ الكبريت. المفاعل يحلل هذه الأُرْبُطَةَ فتتفصل السلاسل الأربع. في الجل تنفصل الجزيئات حسب حجمها: السلسلتان الثقيلتان لهما الحجم نفسه فتظهران **خطًا واحدًا**، والخفيفتان تظهران **خطًا ثانيًا** أبعد. إذن نرى خطين.

× أ: خط واحد نحصل عليه لو بقي الجسم المضاد كاملاً بلا تحليل.

× ب: لا يوجد نوع ثالث من السلاسل في الجسم المضاد.

× د: أربع سلاسل، لكنها نوعان فقط بحجمين، والسلاسل المتساوية في الحجم تتحرك معًا في شريط واحد.

ب — خطان: ثقيل وخفيف

الجواب النهائي للسؤال 8


السؤال 9

السؤال 9

في فحص ELISA لتعيين تركيز أنتيجينات في محلول :

- أ. ذراع الـ Fab للجسم المضاد مرتبطة مع السوبسترات، وذراع الـ Fc التابعة له ترتبط مع الأنتيجين .
- ب. ذراع الـ Fab للجسم المضاد مرتبطة مع السوبسترات، وذراع الـ Fc التابعة له ترتبط هي أيضًا مع السوبسترات أيضًا .
- ج. ذراع الـ Fc للجسم المضاد مرتبطة مع السوبسترات، وذراع الـ Fab التابعة له ترتبط مع الأنتيجين .
- د. ذراع الـ Fc للجسم المضاد مرتبطة مع الأنتيجين، وذراع الـ Fab التابعة له ترتبط هي أيضًا مع الأنتيجين .

نتذكر وظيفة كل ذراع في الجسم المضاد:



الذراعان **Fab** فيهما المنطقة المتغيرة، وهي **موقع الارتباط بالأنتيجين**. أمّا الساق **Fc** فلا ترتبط بالأنتيجين، لذلك نثبت بها الجسم المضاد على **السطح** (الصفحة) في فحص ELISA. هكذا تبقى ذراعا Fab حرتين لالتقاط الأنتيجين من المحلول.

× أ وب: لو ارتبطت الـ Fab بالسطح لكان موقع الارتباط بالأنتيجين مغلقًا، والـ Fc لا ترتبط بالأنتيجين أصلًا.

× د: الـ Fc لا ترتبط بالأنتيجين.

(ملاحظة: في الورقة العربية كلمة «السوبسترات»، وفي العبرية الكلمة تعني «المهاد»، أي السطح الصلب الذي نثبت عليه الجسم المضاد، لا مادة الإنزيم. الجواب لا يتغير.)

ج — الـ Fc مرتبطة بالسطح، والـ Fab ترتبط بالأنتيجين

الجواب النهائي للسؤال 9

السؤال 10

السؤال 10

أيّ عملية ضرورية للحصول على خط خلايا متصل؟

أ. استنساخ

ب. تنمية في ميكرو حاملات

ج. تحوّل

د. معالجة بالإنزيم محلّل الزلاقيات تريپسين

الفكرة: الخلايا العادية تنقسم عددًا محدودًا من المرات ثم تموت.

خلايا المُستنبت الأولي تنقسم عددًا محدودًا من المرات (نحو 50 انقسامًا) ثم تشيخ. **خط الخلايا المتصل** هو خط ينقسم بلا حدود. للحصول عليه يجب أن تمرّ الخلايا **بتحول**: تغيير وراثي (تلقائي، أو بفيروس، أو بمادّة كيميائية) يجعلها «خالدة» مثل الخلايا السرطانية.

× أ: الاستنساخ ينتج مستعمرة من خلية واحدة، لكنّه لا يجعل الخلايا تنقسم بلا حدود.

× ب: الميكرو حاملات تزيد سطح النموّ في المُفاعل، ولا تُغيّر عمر الخلايا.

× ج: التريسين يفصل الخلايا عن السطح عند النقل، وهو ضروريّ لكلّ نقل، لكنّه لا يجعل الخطّ متّصلًا.

ج — تحول

الجواب النهائي للسؤال 10

السؤال 11

السؤال 11

للحصول على "تكاثر حرّ من الفيروسات" عندما ننمّي مُستنبت خلايا نباتيّة:

أ. يجب استعمال مُستنبت كالوس

ب. يجب استعمال مُستنبت بروتوبلاست

ج. يجب استعمال نبات كامل

د. يجب استعمال نسيج مرستيمي

الفكرة: الفيروسات تنتشر في النبات عبر الأنسجة الناقلة.

في قمّة النموّ يوجد **نسيج مرستيمي** لم تصل إليه الأنسجة الناقلة بعد، وخلاياه تنقسم بسرعة كبيرة. لذلك يكون عادةً **خاليًا من الفيروسات**. إذا أخذنا قطعة صغيرة من المرستيم ونقيناها في المختبر، نحصل على نباتات جديدة حرّة من الفيروسات، حتّى لو كان النبات الأمّ مصابًا.

× أ: الكالوس ينتج من نسيج عاديّ قد يكون مصابًا، فيبقى الفيروس فيه.

× ب: البروتوبلاست يؤخذ من خلايا قد تحمل الفيروس، وإزالة الجدار لا تُزيل الفيروس.

× ج: النبات الكامل المصاب يحمل الفيروس في كلّ أنسجته الناقلة.

د — يجب استعمال نسيج مرستيمي

الجواب النهائي للسؤال 11


السؤال 12

السؤال 12

ما هي مراحل إنتاج مُستنبَت خلايا نباتية في محلول معلق؟

- أ. نبات كامل ← نسيج نباتي معقم ← كتلة خلايا غير متميزة ← مُستنبَت كالوس
- ب. نبات كامل ← نسيج نباتي معقم ← مُستنبَت كالوس ← كتلة خلايا غير متميزة
- ج. مُستنبَت كالوس ← كتلة خلايا غير متميزة ← نسيج نباتي معقم ← نبات كامل
- د. مُستنبَت كالوس ← نسيج نباتي معقم ← كتلة خلايا غير متميزة ← نبات كامل

نرتب المراحل من النبات حتى المحلول المعلق:



نبدأ من نبات كامل، ونأخذ منه قطعة نسيج ونعقمها. نزرع النسيج المعقم على وسط صلب فيه هورمونات، فينمو منه مُستنبَت كالوس. بعد ذلك ننقل الكالوس إلى وسط سائل ونحركه، فيتفكك إلى كتل خلايا غير متميزة صغيرة (وخلايا منفردة) تسبح في المحلول. هذا هو المُستنبَت المعلق.

× أ: الكالوس نفسه كتلة خلايا غير متميزة على وسط صلب، والمُستنبَت المعلق يأتي بعده لا قبله.

× ب ود: الترتيب معكوس. هذه مراحل إنتاج نبات كامل من الكالوس (التمايز)، لا مراحل إنتاج مُستنبَت معلق.

ب — نبات، نسيج معقم، كالوس، كتلة خلايا غير متميزة

الجواب النهائي للسؤال 12

نص الأسئلة والصور: وزارة التربية والتعليم، النموذج 842201، صيف 2015. الحل والشرح: فيفو · vevo (لا تنشر وزارة التربية حلولاً لهذا الامتحان). حقوق الطبع للوزارة: «النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم».